

令和2年度血液製剤使用実態調査データ集(埼玉県分)

2020年12月

【1】輸血業務・血液製剤年間使用量基本調査

【1】基本項目

1-1) 医療機関の概要について

1-2. 貴施設の種類のどれに該当しますか(必須入力) 複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	地域医療支援病院	1	0.5%	6	3.2%	7	3.7%	9	4.7%	23	12.1%
2	特定機能病院	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	6	3.2%	9	4.7%
3	臨床研究中核病院	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%
4	一般病院	8	4.2%	85	44.7%	7	3.7%	1	0.5%	101	53.2%
5	診療所	23	12.1%	25	13.2%	0	0.0%	1	0.5%	49	25.8%
6	その他	4	2.1%	2	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	7	3.7%
	回答施設合計	36		121		15		18		190	

1-3. 貴施設の診療科について 複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	心臓血管外科	1	0.5%	9	4.3%	7	3.4%	11	5.3%	28	13.5%
2	消化器外科	2	1.0%	48	23.1%	9	4.3%	12	5.8%	71	34.1%
3	脳神経外科	2	1.0%	29	13.9%	12	5.8%	14	6.7%	57	27.4%
4	呼吸器外科	0	0.0%	5	2.4%	8	3.8%	13	6.3%	26	12.5%
5	整形外科	5	2.4%	72	34.6%	13	6.3%	15	7.2%	105	50.5%
6	産婦人科	1	0.5%	27	13.0%	11	5.3%	12	5.8%	51	24.5%
7	皮膚科・形成外科	7	3.4%	55	26.4%	12	5.8%	15	7.2%	89	42.8%
8	泌尿器科	9	4.3%	52	25.0%	13	6.3%	14	6.7%	88	42.3%
9	その他の外科	1	0.5%	36	17.3%	11	5.3%	12	5.8%	60	28.8%
10	血液内科	2	1.0%	10	4.8%	7	3.4%	10	4.8%	29	13.9%
11	循環器内科	11	5.3%	65	31.3%	14	6.7%	14	6.7%	104	50.0%
12	消化器内科	10	4.8%	59	28.4%	12	5.8%	14	6.7%	95	45.7%
13	呼吸器内科	8	3.8%	41	19.7%	12	5.8%	15	7.2%	76	36.5%
14	腎臓内科	14	6.7%	31	14.9%	12	5.8%	10	4.8%	67	32.2%
15	神経内科	4	1.9%	29	13.9%	11	5.3%	12	5.8%	56	26.9%
16	膠原病リウマチ科	1	0.5%	16	7.7%	6	2.9%	8	3.8%	31	14.9%
17	内分泌代謝科	2	1.0%	19	9.1%	9	4.3%	9	4.3%	39	18.8%
18	その他の内科	13	6.3%	42	20.2%	9	4.3%	11	5.3%	75	36.1%
19	精神科・心療内科	1	0.5%	11	5.3%	6	2.9%	12	5.8%	30	14.4%
20	小児科	5	2.4%	30	14.4%	10	4.8%	14	6.7%	59	28.4%
21	腫瘍治療科	0	0.0%	1	0.5%	3	1.4%	3	1.4%	7	3.4%
22	救急科	0	0.0%	16	7.7%	11	5.3%	13	6.3%	40	19.2%
23	歯科・口腔外科	2	1.0%	14	6.7%	4	1.9%	13	6.3%	33	15.9%
24	その他の診療科	3	1.4%	17	8.2%	7	3.4%	12	5.8%	39	18.8%
	回答施設合計	11		89		41		67		208	

1-4. 2019年4月～2020年3月の期間で、全麻手術を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	1	0.6%	72	40.4%	13	7.3%	14	7.9%	100	56.2%
2	いいえ	31	17.4%	41	23.0%	0	0.0%	1	0.6%	73	41.0%
3	わからない	0	0.0%	4	2.2%	1	0.6%	0	0.0%	5	2.8%
	回答施設合計	32		117		14		15		178	

全麻手術件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	－	－	－	－	－
1～299床	61	1	2,039	337.7	20,599	420.9
300～499床	12	692	3,607	1,997.7	23,972	843.2
500床以上	13	1,147	11,205	4,499.2	58,489	2,547.1
全体	86	1	11,205	1,198.4	103,060	1,849.6

1-5. 2019年4月～2020年3月の期間で、心臓・大血管手術を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	4	2.2%	5	2.8%	11	6.2%	20	11.2%
2	いいえ	33	18.5%	112	62.9%	7	3.9%	4	2.2%	156	87.6%
3	わからない	0	0.0%	1	0.6%	1	0.6%	0	0.0%	2	1.1%
	回答施設合計	33		117		13		15		178	

心臓・大血管手術件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	－	－	－	－	－
1～299床	3	23	185	120.0	360	85.6
300～499床	5	38	343	202.2	1,011	149.5
500床以上	11	18	614	274.3	3,017	222.6
全体	19	18	614	230.9	4,388	191.7

1-6. 2019年4月～2020年3月の期間で、帝王切開を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	1	0.6%	16	8.9%	6	3.4%	10	5.6%	33	18.4%
2	いいえ	32	17.9%	101	56.4%	8	4.5%	5	2.8%	146	81.6%
3	わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	33		117		14		15		179	

帝王切開件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	1	139	139	139.0	139	—
1～299床	16	20	257	111.6	1,786	71.3
300～499床	5	82	315	146.0	730	98.5
500床以上	9	38	511	232.2	2,090	135.5
全体	31	20	511	153.1	4,745	107.4

1-7. 2019年4月～2020年3月の期間で、造血幹細胞移植を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	6	3.4%	7	3.9%
2	いいえ	33	18.5%	116	65.2%	12	6.7%	9	5.1%	170	95.5%
3	わからない	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	回答施設合計	33		117		13		15		178	

造血幹細胞移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	—	—	—	—	—
1～299床	0	—	—	—	—	—
300～499床	1	25	25	25.0	25	—
500床以上	6	5	96	29.0	174	33.7
全体	7	5	96	28.4	199	30.8

1-8. 2019年4月～2020年3月の期間で、臓器(腎・肝・心・膵)移植を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	1	0.6%	1	0.6%	1	0.6%	5	2.8%	8	4.5%
2	いいえ	31	17.5%	114	64.4%	13	7.3%	10	5.6%	168	94.9%
3	わからない	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	回答施設合計	32		116		14		15		177	

1-9. 2019年4月～2020年3月の期間で、腎臓移植を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	50.0%	5	62.5%
2	いいえ	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%	1	12.5%	3	37.5%
3	わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	1		1		1		5		8	

腎臓移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	－	－	－	－	－
1～299床	0	－	－	－	－	－
300～499床	0	－	－	－	－	－
500床以上	4	2	25	12.0	48	10.9
全体	4	2	25	12.0	48	10.9

1-10. 2019年4月～2020年3月の期間で、肝臓移植を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%	3	37.5%
2	いいえ	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	4	50.0%	5	62.5%
3	わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	1		1		1		5		8	

肝臓移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	－	－	－	－	－
1～299床	0	－	－	－	－	－
300～499床	1	4	4	4.0	4	－
500床以上	1	2	2	2.0	2	－
全体	2	2	4	3.0	6	1.4

1-11. 2019年4月～2020年3月の期間で、心臓移植を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	2	25.0%
2	いいえ	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%	4	50.0%	6	75.0%
3	わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	1		1		1		5		8	

心臓移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	－	－	－	－	－
1～299床	0	－	－	－	－	－
300～499床	0	－	－	－	－	－
500床以上	1	4	4	4.0	4	－
全体	1	4	4	4.0	4	－

1-12. 2019年4月～2020年3月の期間で、臓器移植を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%
2	いいえ	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%	5	62.5%	7	87.5%
3	わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	1		1		1		5		8	

臓器移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	－	－	－	－	－
1～299床	0	－	－	－	－	－
300～499床	0	－	－	－	－	－
500床以上	0	－	－	－	－	－
全体	0	－	－	－	－	－

1-13. 2019年4月～2020年3月の期間で、血漿交換を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	3	1.8%	9	5.4%	11	6.6%	23	13.8%
2	いいえ	33	19.8%	99	59.3%	4	2.4%	4	2.4%	140	83.8%
3	わからない	0	0.0%	3	1.8%	1	0.6%	0	0.0%	4	2.4%
	回答施設合計	33		105		14		15		167	

血漿交換件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	－	－	－	－	－
1～299床	3	1	5	3.0	9	2.0
300～499床	8	1	42	9.5	76	14.1
500床以上	10	2	235	45.4	454	69.2
全体	21	1	235	25.7	539	51.0

1-14. 救急医療の体制について

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	一次救急指定病院	0	0.0%	10	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	10	5.4%
2	二次救急指定病院	1	0.5%	59	31.7%	11	5.9%	7	3.8%	78	41.9%
3	三次救急指定病院	0	0.0%	0	0.0%	2	1.1%	7	3.8%	9	4.8%
4	救命救急センター	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	5	2.7%	6	3.2%
5	高度救命救急センター	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.6%	3	1.6%
6	救急指定病院ではない	31	16.7%	47	25.3%	0	0.0%	2	1.1%	80	43.0%
	回答施設合計	32		116		14		24		186	

1-15. オーダリングシステムを導入していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	4	2.2%	43	23.9%	13	7.2%	14	7.8%	74	41.1%
2	導入していない	30	16.7%	74	41.1%	1	0.6%	1	0.6%	106	58.9%
	回答施設合計	34		117		14		15		180	

1-16. 問1-15で「(1) 導入している」を選択した施設にお尋ねします。輸血業務でオーダリングシステムを利用している対象は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血関連検査	2	0.7%	36	12.6%	12	4.2%	13	4.5%	63	22.0%
2	日赤血液製剤輸血	3	1.0%	29	10.1%	11	3.8%	14	4.9%	57	19.9%
3	貯血式自己血製剤貯血	1	0.3%	13	4.5%	9	3.1%	13	4.5%	36	12.6%
4	貯血式自己血製剤輸血	1	0.3%	12	4.2%	10	3.5%	13	4.5%	36	12.6%
5	希釈式自己血製剤輸血	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%	2	0.7%
6	回収式自己血製剤輸血	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
7	院内成分採血製剤(末梢血幹細胞等)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.4%	4	1.4%
8	院内調製血(分割製剤等)	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	5	1.7%	6	2.1%
9	輸血副作用	1	0.3%	11	3.8%	9	3.1%	12	4.2%	33	11.5%
10	細胞治療(再生医療等製品)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	3	1.0%
11	ベッドサイドで患者と製剤の認証	2	0.7%	18	6.3%	11	3.8%	12	4.2%	43	15.0%
12	その他	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.7%
	回答施設合計	11		121		64		90		286	

1-17. 問1-15で「(1) 導入している」を選択した施設にお尋ねします。血漿分画製剤業務でオーダリングシステムを利用している対象は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血漿分画製剤(アルブミン製剤)	1	0.7%	33	23.1%	9	6.3%	11	7.7%	54	37.8%
2	血漿分画製剤(アルブミン製剤以外)	0	0.0%	23	16.1%	8	5.6%	8	5.6%	39	27.3%
3	血漿分画製剤投与後の副作用	0	0.0%	5	3.5%	1	0.7%	5	3.5%	11	7.7%
4	ベッドサイドで患者と製剤の認証	2	1.4%	15	10.5%	5	3.5%	9	6.3%	31	21.7%
5	細胞治療(再生医療等製品)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.1%	3	2.1%
6	その他	1	0.7%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.5%
	回答施設合計	4		80		23		36		143	

1-18. 輸血業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム)を導入していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	0	0.0%	33	18.3%	13	7.2%	13	7.2%	59	32.8%
2	導入していない	33	18.3%	80	44.4%	1	0.6%	2	1.1%	116	64.4%
	回答施設合計	33		113		14		15		175	

1-19. 問1-18で「(1)導入している」を選択した施設にお尋ねします。システムを利用している範囲は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血関連検査	0	0.0%	27	9.6%	12	4.3%	13	4.6%	52	18.4%
2	日赤血液製剤入庫	0	0.0%	21	7.4%	12	4.3%	13	4.6%	46	16.3%
3	日赤血液製剤輸血	0	0.0%	20	7.1%	10	3.5%	13	4.6%	43	15.2%
4	貯血式自己血製剤貯血	0	0.0%	15	5.3%	11	3.9%	13	4.6%	39	13.8%
5	貯血式自己血製剤輸血	0	0.0%	13	4.6%	9	3.2%	13	4.6%	35	12.4%
6	希釈式自己血製剤輸血	0	0.0%	1	0.4%	1	0.4%	1	0.4%	3	1.1%
7	回収式自己血製剤輸血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	院内成分採血製剤 (末梢血幹細胞等)	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	4	1.4%	5	1.8%
9	院内調製血(分割製剤等)	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	4	1.4%	5	1.8%
10	輸血副作用	0	0.0%	11	3.9%	8	2.8%	13	4.6%	32	11.3%
11	細胞治療(再生医療等製品)	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	2	0.7%	3	1.1%
12	ベッドサイドで患者と製剤の認証	0	0.0%	7	2.5%	3	1.1%	7	2.5%	17	6.0%
13	輸血手帳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.7%	2	0.7%
14	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		116		68		98		282	

1-20. 血漿分画製剤管理業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム・血漿分画製剤管理システム)を導入していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	0	0.0%	15	8.9%	6	3.6%	8	4.8%	29	17.3%
2	導入していない	31	18.5%	94	56.0%	7	4.2%	7	4.2%	139	82.7%
	回答施設合計	31		109		13		15		168	

1-21. 問1-20で「(1)導入している」を選択した施設にお尋ねします。システムを利用している範囲は 複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血漿分画製剤(アルブミン製剤)	0	0.0%	15	23.8%	5	7.9%	7	11.1%	27	42.9%
2	血漿分画製剤(アルブミン製剤以外)	0	0.0%	8	12.7%	5	7.9%	3	4.8%	16	25.4%
3	血漿分画製剤投与後の副作用	0	0.0%	3	4.8%	1	1.6%	5	7.9%	9	14.3%
4	細胞治療(再生医療等製品)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.6%
5	ベッドサイドで患者と製剤の認証	0	0.0%	8	12.7%	1	1.6%	1	1.6%	10	15.9%
6	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		34		12		17		63	

1-2) 血液製剤の納入状況について

1-22. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血用血液製剤(赤血球製剤、血小板製剤、新鮮凍結血漿)を購入しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	33	18.4%	113	63.1%	14	7.8%	15	8.4%	175	97.8%
2	購入していない	2	1.1%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.2%
	回答施設合計	35		115		14		15		179	

1-23. 2019年4月～2020年3月の期間で赤血球製剤を購入しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	32	18.4%	113	64.9%	14	8.0%	15	8.6%	174	100.0%
2	購入していない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	32		113		14		15		174	

1-24. 2019年4月～2020年3月の期間で購入した赤血球製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、 照射赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0床	18	1	237	24.1	433	55.2
	1～299床	81	1	528	35.3	2,856	75.8
	300～499床	12	2	1,044	232.9	2,795	378.9
	500床以上	15	2	1,136	173.9	2,608	330.7
	全体	126	1	1,136	69.0	8,692	184.1
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、 照射赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0床	26	2	198	25.2	655	39.2
	1～299床	105	1	2,468	245.0	25,725	352.9
	300～499床	14	603	4,312	1,793.4	25,107	955.5
	500床以上	15	42	9,067	4,239.7	63,595	2,468.5
	全体	160	1	9,067	719.3	115,082	1,480.2
(3) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-1、 照射洗浄赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	3	4	30	14.3	43	13.8
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	1	1	1.0	1	—
	全体	4	1	30	11.0	44	13.1
(4) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-2、 照射洗浄赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0床	3	4	37	19.7	59	16.6
	1～299床	6	1	202	68.5	411	100.7
	300～499床	2	1	50	25.5	51	34.6
	500床以上	4	7	20	14.3	57	5.4
	全体	15	1	202	38.5	578	66.4
(5) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-1、 照射解凍赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1	1	1.0	1	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	1	1	1.0	1	—
(6) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-2、 照射解凍赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	5	5	5.0	5	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	5	5	5.0	5	—
(7) 合成血液-LR-1、 照射合成血液-LR-1製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(8) 合成血液-LR-2、 照射合成血液-LR-2製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

【特別集計：赤血球製剤の購入総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤総袋(本)数	0床	32	2	274	35.8	1,147	58.3
	1～299床	112	1	2,532	259.3	29,041	365.3
	300～499床	14	605	4,315	1,996.6	27,953	1,045.3
	500床以上	15	47	9,428	4,417.4	66,261	2,656.2
	全体	173	1	9,428	719.1	124,402	1,514.5
赤血球製剤総単位数	0床	32	4	396	58.2	1,861	87.3
	1～299床	112	2	5,000	492.7	55,182	707.9
	300～499床	14	1,208	8,628	3,793.6	53,111	1,971.3
	500床以上	15	89	18,495	8,660.9	129,913	5,120.3
	全体	173	2	18,495	1,387.7	240,067	2,947.4

1-25. 2019年4月～2020年3月の期間で血小板製剤を購入しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	5	2.9%	59	33.9%	14	8.0%	15	8.6%	93	53.4%
2	購入していない	28	16.1%	53	30.5%	0	0.0%	0	0.0%	81	46.6%
	回答施設合計	33		112		14		15		174	

1-26. 2019年4月～2020年3月の期間で購入した血小板製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1製剤)／袋(本)	0床	2	1	8	4.5	9	4.9
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	0	－	－	－	－	－
	全体	2	1	8	4.5	9	4.9
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2製剤)／袋(本)	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	1	8	8	8.0	8	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	0	－	－	－	－	－
	全体	1	8	8	8.0	8	－
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5製剤)／袋(本)	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	4	1	6	3.3	13	2.2
	300～499床	9	2	18	6.1	55	5.8
	500床以上	12	2	51	13.8	165	14.3
	全体	25	1	51	9.3	233	11.2
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10製剤)／袋(本)	0床	3	1	13	5.0	15	6.9
	1～299床	56	1	402	41.2	2,308	69.8
	300～499床	14	30	2,628	544.7	7,626	752.3
	500床以上	15	8	2,858	1,191.7	17,875	919.3
	全体	88	1	2,858	316.2	27,824	645.2
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15製剤)／袋(本)	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	15	1	21	4.7	70	6.3
	300～499床	14	2	142	23.8	333	37.7
	500床以上	13	5	894	103.5	1,346	242.7
	全体	42	1	894	41.6	1,749	139.8

1-26. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	20	1	20	6.6	131	7.2
	300～499床	12	2	69	21.7	260	21.3
	500床以上	13	2	118	29.3	381	30.7
	全体	45	1	118	17.2	772	22.2
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-LR-10、照射濃厚血小板HLA-LR-10製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	3	17	26	21.7	65	4.5
	500床以上	6	2	73	30.2	181	30.4
	全体	9	2	73	27.3	246	24.5
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-LR-15、照射濃厚血小板HLA-LR-15製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	3	1	1	1.0	3	0.0
	500床以上	4	1	14	5.0	20	6.1
	全体	7	1	14	3.3	23	4.8
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-LR-20、照射濃厚血小板HLA-LR-20製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1	1	1.0	1	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	2	2	6	4.0	8	2.8
	全体	3	1	6	3.0	9	2.6
(10) 人血小板濃厚液 (照射洗浄血小板-LR-10製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	28	28	28.0	28	—
	300～499床	3	1	190	82.3	247	97.2
	500床以上	4	2	116	56.8	227	48.1
	全体	8	1	190	62.8	502	63.6
(11) 人血小板濃厚液 (照射洗浄血小板-HLA-LR-10製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	2	1	35	18.0	36	24.0
	全体	2	1	35	18.0	36	24.0

【特別集計：血小板製剤の購入総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤総袋(本)数	0床	5	1	13	4.8	24	5.5
	1～299床	58	1	447	44.1	2,559	75.2
	300～499床	14	32	2,857	613.5	8,589	812.4
	500床以上	15	8	3,085	1,349.3	20,239	1,035.7
	全体	92	1	3,085	341.4	31,411	710.1
血小板製剤総単位数	0床	5	1	130	31.8	159	55.0
	1～299床	58	10	4,725	467.8	27,131	796.0
	300～499床	14	330	28,930	6,421.1	89,895	8,250.9
	500床以上	15	80	31,700	14,152.3	212,285	10,967.5
	全体	92	1	31,700	3,581.2	329,470	7,426.9

1-27. 2019年4月～2020年3月の期間で血漿製剤を購入しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	1	0.6%	58	33.5%	14	8.1%	15	8.7%	88	50.9%
2	購入していない	31	17.9%	54	31.2%	0	0.0%	0	0.0%	85	49.1%
	回答施設合計	32		112		14		15		173	

1-28. 2019年4月～2020年3月の期間で購入した血漿製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	21	1	13	4.1	87	3.5
	300～499床	7	1	260	43.0	301	96.0
	500床以上	10	1	452	71.0	710	140.3
	全体	38	1	452	28.9	1,098	84.6
(2) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0床	1	9	9	9.0	9	—
	1～299床	51	1	974	65.3	3,330	162.1
	300～499床	14	2	1,673	525.2	7,353	559.2
	500床以上	14	4	4,629	1,359.4	19,032	1,340.0
	全体	80	1	4,629	371.6	29,724	776.5
(3) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	23	1	159	23.9	549	37.6
	300～499床	10	1	258	54.8	548	81.3
	500床以上	14	1	1,840	414.0	5,796	516.9
	全体	47	1	1,840	146.7	6,893	329.5

【特別集計:血漿製剤の購入総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
新鮮凍結血漿製剤の購入総袋(本)数	0床	1	9	9	9.0	9	－
	1～299床	57	1	996	69.6	3,966	158.9
	300～499床	14	62	1,821	585.9	8,202	568.4
	500床以上	14	151	5,133	1,824.1	25,538	1,393.8
	全体	86	1	5,133	438.5	37,715	881.2
新鮮凍結血漿製剤の総単位数	0床	1	18	18	18.0	18	－
	1～299床	57	1	2,030	156.9	8,943	333.8
	300～499床	14	132	3,872	1,228.5	17,199	1,165.4
	500床以上	14	313	10,869	4,425.6	61,958	3,139.7
	全体	86	1	10,869	1,024.6	88,118	2,053.7

1-3) 血液製剤の廃棄状況について

1-29. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血用血液製剤(赤血球製剤、血小板製剤、新鮮凍結血漿)を使用せずに廃棄しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	6	3.4%	71	39.9%	14	7.9%	14	7.9%	105	59.0%
2	廃棄していない	27	15.2%	45	25.3%	0	0.0%	1	0.6%	73	41.0%
	回答施設合計	33		116		14		15		178	

1-30. 2019年4月～2020年3月の期間で赤血球製剤を使用せずに廃棄しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	6	5.8%	69	66.3%	14	13.5%	14	13.5%	103	99.0%
2	廃棄していない	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	回答施設合計	6		70		14		14		104	

1-31. 2019年4月～2020年3月の期間で使用せずに廃棄した赤血球製剤の総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0床	2	1	3	2.0	4	1.4
	1～299床	20	1	53	6.1	122	11.6
	300～499床	3	2	23	9.7	29	11.6
	500床以上	5	1	5	2.2	11	1.8
	全体	30	1	53	5.5	166	10.1
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0床	3	1	2	1.3	4	0.6
	1～299床	60	1	115	12.8	767	20.9
	300～499床	14	7	169	42.1	589	43.5
	500床以上	14	8	62	29.2	409	18.1
	全体	91	1	169	19.4	1,769	27.2
(3) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-1、照射洗浄赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	1	1	1.0	1	—
	全体	1	1	1	1.0	1	—
(4) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-2、照射洗浄赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	4	1	6	2.5	10	2.4
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	7	7	7.0	7	—
	全体	5	1	7	3.4	17	2.9
(5) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-1、照射解凍赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(6) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-2、照射解凍赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(7) 合成血液-LR-1、照射合成血液-LR-1製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(8) 合成血液-LR-2、照射合成血液-LR-2製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

【特別集計：赤血球製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤廃棄の廃棄総袋(本)数	0床	5	1	3	1.6	8	0.9
	1～299床	67	1	132	13.4	899	24.3
	300～499床	14	8	169	44.1	618	43.8
	500床以上	14	8	63	30.6	428	17.9
	全体	100	1	169	19.5	1,953	28.8
赤血球製剤廃棄の総単位数	0床	5	1	4	2.4	12	1.1
	1～299床	67	1	232	25.0	1,676	44.0
	300～499床	14	16	338	86.2	1,207	87.0
	500床以上	14	16	125	60.3	844	35.4
	全体	100	1	338	37.4	3,739	55.0

1-32. 2019年4月～2020年3月の期間で赤血球製剤を使用せずに廃棄した要因の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0床	1	1	1	1.0	1	－
	1～299床	47	1	132	15.7	736	27.5
	300～499床	13	7	154	42.2	548	41.6
	500床以上	13	2	54	21.2	276	17.8
	全体	74	1	154	21.1	1,561	30.2
(2) 破損	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	1	2	2	2.0	2	－
	300～499床	3	1	6	2.7	8	2.9
	500床以上	7	1	2	1.3	9	0.5
	全体	11	1	6	1.7	19	1.5
(3) 保管管理不良	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	5	1	2	1.4	7	0.5
	300～499床	5	1	6	2.0	10	2.2
	500床以上	7	5	15	8.9	62	4.2
	全体	17	1	15	4.6	79	4.6
(4) 転用ができない	0床	3	1	2	1.3	4	0.6
	1～299床	18	1	30	4.1	74	6.8
	300～499床	7	1	17	6.9	48	6.7
	500床以上	6	3	14	9.0	54	4.7
	全体	34	1	30	5.3	180	6.3
(5) その他	0床	1	1	1	1.0	1	－
	1～299床	7	1	6	2.6	18	2.1
	300～499床	4	1	1	1.0	4	0.0
	500床以上	5	1	8	2.8	14	2.9
	全体	17	1	8	2.2	37	2.1

1-33. 2019年4月～2020年3月の期間で血小板製剤を使用せずに廃棄しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	1	1.0%	5	4.9%	9	8.8%	13	12.7%	28	27.5%
2	廃棄していない	5	4.9%	63	61.8%	5	4.9%	1	1.0%	74	72.5%
	回答施設合計	6		68		14		14		102	

1-34. 2019年4月～2020年3月の期間で使用せずに廃棄した血小板製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	1	1	1.0	1	—
	500床以上	1	1	1	1.0	1	—
	全体	2	1	1	1.0	2	0.0
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	4	1	2	1.5	6	0.6
	300～499床	9	1	29	6.0	54	9.8
	500床以上	12	1	14	5.9	71	4.4
	全体	25	1	29	5.2	131	6.6
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	3	1	1	1.0	3	0.0
	500床以上	1	2	2	2.0	2	—
	全体	4	1	2	1.3	5	0.5
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1	1	1.0	1	—
	300～499床	2	1	1	1.0	2	0.0
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	3	1	1	1.0	3	0.0

1-34. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-LR-10、照射濃厚血小板HLA-LR-10製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-LR-15、照射濃厚血小板HLA-LR-15製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-LR-20、照射濃厚血小板HLA-LR-20製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(10) 人血小板濃厚液 (照射洗浄血小板-LR-10製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(11) 人血小板濃厚液 (照射洗浄血小板-HLA-LR-10製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	1	1	1.0	1	—
	全体	1	1	1	1.0	1	—

【特別集計：血小板製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤の廃棄総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	5	1	2	1.4	7	0.5
	300～499床	9	1	32	6.7	60	10.6
	500床以上	13	1	15	5.8	75	4.6
	全体	27	1	32	5.3	142	6.9
血小板製剤の廃棄総単位数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	5	10	20	16.0	80	5.5
	300～499床	9	10	330	70.0	630	108.4
	500床以上	13	5	150	58.1	755	46.4
	全体	27	5	330	54.3	1,465	70.7

1-35. 2019年4月～2020年3月の期間で血小板製剤を使用せずに廃棄した要因の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	2	1	1	1.0	2	0.0
	300～499床	4	1	32	11.5	46	13.9
	500床以上	9	1	12	4.9	44	4.2
	全体	15	1	32	6.1	92	8.0
(2) 破損	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	2	1	1	1.0	2	0.0
	全体	2	1	1	1.0	2	0.0
(3) 保管管理不良	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	1	3	3	3.0	3	－
	500床以上	1	1	1	1.0	1	－
	全体	2	1	3	2.0	4	1.4
(4) 転用ができない	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	2	1	1	1.0	2	0.0
	300～499床	3	1	5	2.3	7	2.3
	500床以上	4	2	12	5.8	23	4.5
	全体	9	1	12	3.6	32	3.7
(5) その他	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	1	2	2	2.0	2	－
	300～499床	3	1	2	1.3	4	0.6
	500床以上	0	－	－	－	－	－
	全体	4	1	2	1.5	6	0.6

1-36. 2019年4月～2020年3月の期間で血漿製剤を使用せずに廃棄しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	1	1.0%	28	27.7%	14	13.9%	13	12.9%	56	55.4%
2	廃棄していない	5	5.0%	39	38.6%	0	0.0%	1	1.0%	45	44.6%
	回答施設合計	6		67		14		14		101	

1-37. 2019年4月～2020年3月の期間で使用せずに廃棄した血漿製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	2	1	1	1.0	2	0.0
	300～499床	1	8	8	8.0	8	—
	500床以上	3	1	5	2.7	8	2.1
	全体	6	1	8	3.0	18	2.9
(2) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	25	1	19	4.6	114	4.1
	300～499床	13	6	26	12.6	164	5.8
	500床以上	12	1	63	15.8	189	19.1
	全体	50	1	63	9.3	467	11.1
(3) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	7	1	9	2.7	19	3.0
	300～499床	5	1	9	3.4	17	3.4
	500床以上	7	1	11	4.4	31	3.6
	全体	19	1	11	3.5	67	3.2

【特別集計：血漿製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
新鮮凍結血漿製剤の廃棄総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	28	1	19	4.8	135	4.7
	300～499床	14	6	26	13.5	189	6.0
	500床以上	13	1	64	17.5	228	17.6
	全体	55	1	64	10.0	552	10.9
新鮮凍結血漿製剤の廃棄総単位数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	28	2	52	10.9	306	11.7
	300～499床	14	12	54	28.9	404	13.0
	500床以上	13	2	130	39.2	510	34.9
	全体	55	2	130	22.2	1,220	23.0

1-38. 2019年4月～2020年3月の期間で血漿製剤を使用せずに廃棄した要因の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	23	1	18	5.0	115	4.4
	300～499床	10	4	22	13.0	130	5.3
	500床以上	8	3	13	6.6	53	4.2
	全体	41	1	22	7.3	298	5.6
(2) 破損	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	4	1	1	1.0	4	0.0
	300～499床	4	1	2	1.5	6	0.6
	500床以上	11	1	15	4.4	48	4.5
	全体	19	1	15	3.1	58	3.7
(3) 保管管理不良	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	1	1	1	1.0	1	－
	300～499床	2	1	5	3.0	6	2.8
	500床以上	2	1	3	2.0	4	1.4
	全体	5	1	5	2.2	11	1.8
(4) 転用ができない	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	4	2	7	4.3	17	2.2
	300～499床	8	1	11	5.5	44	3.8
	500床以上	6	1	32	10.0	60	11.6
	全体	18	1	32	6.7	121	7.2
(5) その他	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	3	1	2	1.3	4	0.6
	300～499床	2	1	2	1.5	3	0.7
	500床以上	4	1	42	12.0	48	20.0
	全体	9	1	42	6.1	55	13.5

1-4) 血漿分画製剤(アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤)の購入状況について

1-39. 2019年4月～2020年3月の期間で下記の該当する血漿分画製剤を購入しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	3	1.7%	81	45.8%	14	7.9%	14	7.9%	112	63.3%
2	購入していない	32	18.1%	32	18.1%	0	0.0%	1	0.6%	65	36.7%
	回答施設合計	35		113		14		15		177	

1-40. 2019年4月～2020年3月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%、)を購入しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	2	1.9%	76	70.4%	14	13.0%	14	13.0%	106	98.1%
2	購入していない	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%
	回答施設合計	2		78		14		14		108	

1-41. 2019年4月～2020年3月の期間で購入したアルブミン製剤の本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤5% (5.0g/100mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	3	3	3.0	3	—
	300～499床	1	240	240	240.0	240	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	2	3	240	121.5	243	167.6
(2) 等張アルブミン製剤5% (12.5g/250 mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	19	2	480	68.2	1,296	123.4
	300～499床	10	25	1,965	462.9	4,629	591.7
	500床以上	11	270	3,575	1,453.7	15,991	1,196.4
	全体	40	2	3,575	547.9	21,916	894.6
(3) 高張アルブミン製剤20% (4.0g/20 mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(4) 高張アルブミン製剤20% (10.0g/50 mL)/本	0床	1	6	6	6.0	6	—
	1～299床	20	6	1,130	207.3	4,145	255.8
	300～499床	6	9	1,040	583.0	3,498	380.3
	500床以上	7	560	4,660	2,032.9	14,230	1,535.5
	全体	34	6	4,660	643.5	21,879	1,013.0
(5) 高張アルブミン製剤25% (5.0g/20 mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	200	200	200.0	200	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	200	200	200.0	200	—
(6) 高張アルブミン製剤25% (12.5g/50 mL)/本	0床	1	18	18	18.0	18	—
	1～299床	52	3	520	106.0	5,514	121.8
	300～499床	9	140	1,611	754.1	6,787	513.5
	500床以上	8	33	2,495	1,287.6	10,301	826.0
	全体	70	3	2,495	323.1	22,620	528.9

【特別集計：アルブミン製剤購入量(g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤(5%)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	20	15	6,000	810.8	16,215	1,513.1
	300～499床	11	313	24,563	5,369.3	59,063	7,151.8
	500床以上	11	3,375	44,688	18,171.6	199,888	14,954.8
	全体	42	15	44,688	6,551.5	275,165	10,989.2
(2) 高張アルブミン製剤(20%)	0床	1	60	60	60.0	60	—
	1～299床	20	60	11,300	2,072.5	41,450	2,558.4
	300～499床	6	90	10,400	5,830.0	34,980	3,803.2
	500床以上	7	5,600	46,600	20,328.6	142,300	15,355.3
	全体	34	60	46,600	6,435.0	218,790	10,129.6
(3) 高張アルブミン製剤(25%)	0床	1	225	225	225.0	225	—
	1～299床	52	38	6,500	1,325.5	68,925	1,522.5
	300～499床	9	1,750	20,138	9,537.5	85,838	6,352.9
	500床以上	8	413	31,188	16,095.3	128,763	10,324.6
	全体	70	38	31,188	4,053.6	283,750	6,615.3
(4) アルブミン製剤	0床	2	60	225	142.5	285	116.7
	1～299床	75	15	15,300	1,687.9	126,590	2,318.2
	300～499床	13	2,563	35,313	13,836.9	179,880	9,822.7
	500床以上	14	5,600	79,138	33,639.3	470,950	23,919.8
	全体	104	15	79,138	7,477.9	777,705	14,522.5

1-42. 2019年4月～2020年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を購入しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	0	0.0%	49	45.8%	12	11.2%	11	10.3%	72	67.3%
2	購入していない	3	2.8%	31	29.0%	0	0.0%	1	0.9%	35	32.7%
	回答施設合計	3		80		12		12		107	

1-43. 2019年4月～2020年3月の期間で購入した免疫グロブリン製剤(静注)の本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:静注5% (0.5g/10mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	3	8	204	112.0	336	98.5
	500床以上	2	61	128	94.5	189	47.4
	全体	5	8	204	105.0	525	74.2
(2) 免疫グロブリン製剤:静注5% (1.0g/20mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) 免疫グロブリン製剤:静注5% (2.5g/50mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	32	1	324	58.3	1,866	75.2
	300～499床	11	2	1,436	324.5	3,569	411.3
	500床以上	6	17	921	248.5	1,491	352.8
	全体	49	1	1,436	141.3	6,926	256.1
(4) 免疫グロブリン製剤:静注5% (5.0g/100mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	15	8	419	68.3	1,025	101.8
	300～499床	9	36	972	422.8	3,805	278.1
	500床以上	8	43	4,962	1,281.4	10,251	1,597.1
	全体	32	8	4,962	471.3	15,081	921.5
(5) 免疫グロブリン製剤:静注5% (10.0g/200mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(6) 免疫グロブリン製剤:静注10% (0.5g/5mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	87	87	87.0	87	—
	500床以上	3	6	157	57.3	172	86.3
	全体	4	6	157	64.8	259	72.0

1-43. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 免疫グロブリン製剤:静注10% (2.5g/25mL)/本	1~299床	1	6	6	6.0	6	—
	300~499床	2	27	212	119.5	239	130.8
	500床以上	3	30	139	100.7	302	61.3
	全体	6	6	212	91.2	547	82.2
(8) 免疫グロブリン製剤:静注10% (5.0g/50mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	6	7	210	71.7	430	76.9
	300~499床	2	50	1,009	529.5	1,059	678.1
	500床以上	6	140	767	441.3	2,648	278.8
	全体	14	7	1,009	295.5	4,137	330.0
(9) 免疫グロブリン製剤:静注10% (10.0g/100mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	1	149	149	149.0	149	—
	500床以上	2	38	136	87.0	174	69.3
	全体	3	38	149	107.7	323	60.7
(10) 免疫グロブリン製剤:静注10% (20.0g/200mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	1	6	6	6.0	6	—
	500床以上	2	211	354	282.5	565	101.1
	全体	3	6	354	190.3	571	174.9

【特別集計:免疫グロブリン製剤(静注)購入量(g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤:静注/(g)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	49	3	3,145	244.0	11,955	465.9
	300~499床	12	470	8,266	2,971.8	35,662	2,545.4
	500床以上	9	215	36,242	9,133.1	82,198	10,991.9
	全体	70	3	36,242	1,854.5	129,815	4,915.4

1-44. 2019年4月～2020年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)を購入しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	0	0.0%	1	1.0%	2	1.9%	4	3.9%	7	6.8%
2	購入していない	3	2.9%	77	74.8%	10	9.7%	6	5.8%	96	93.2%
	回答施設合計	3		78		12		10		103	

1-45. 2019年4月～2020年3月の期間で購入した免疫グロブリン製剤(皮下注)の本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:皮下注20% (1.0g/5mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	2	96	164	130.0	260	48.1
	500床以上	1	15	15	15.0	15	—
	全体	3	15	164	91.7	275	74.6
(2) 免疫グロブリン製剤:皮下注20% (2.0g/10mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	2	12	198	105.0	210	131.5
	500床以上	4	5	143	54.3	217	60.8
	全体	6	5	198	71.2	427	79.8
(3) 免疫グロブリン製剤:皮下注20% (4.0g/20mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	6	6	6.0	6	—
	300～499床	2	8	324	166.0	332	223.4
	500床以上	2	14	146	80.0	160	93.3
	全体	5	6	324	99.6	498	138.7

【特別集計:免疫グロブリン製剤(皮下注)購入量(g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤:皮下注/(g)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	24	24	24.0	24	—
	300～499床	2	220	1,788	1,004.0	2,008	1,108.7
	500床以上	4	10	870	272.3	1,089	401.2
	全体	7	10	1,788	445.9	3,121	662.5

1-5) 血漿分画製剤(アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤)の廃棄状況について

1-46. 2019年4月～2020年3月の期間で、血漿分画製剤(参考資料3:該当する血漿分画製剤参照)を使用せずに廃棄しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	1	0.6%	11	6.5%	8	4.7%	9	5.3%	29	17.1%
2	廃棄していない	33	19.4%	98	57.6%	6	3.5%	4	2.4%	141	82.9%
	回答施設合計	34		109		14		13		170	

1-47. 2019年4月～2020年3月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%)を使用せずに廃棄しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	1	3.6%	6	21.4%	7	25.0%	7	25.0%	21	75.0%
2	廃棄していない	0	0.0%	4	14.3%	1	3.6%	2	7.1%	7	25.0%
	回答施設合計	1		10		8		9		28	

1-48. 2019年4月～2020年3月の期間で使用せずに廃棄したアルブミン製剤の本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤5% 5.0g/100mL/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) 等張アルブミン製剤5% (12.5g/250 mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	3	1	3	2.0	6	1.0
	300～499床	4	1	2	1.5	6	0.6
	500床以上	4	1	4	2.3	9	1.5
	全体	11	1	4	1.9	21	1.0
(3) 高張アルブミン製剤20% (4.0g/20 mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(4) 高張アルブミン製剤20% (10.0g/50 mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1	1	1.0	1	—
	300～499床	2	1	5	3.0	6	2.8
	500床以上	4	1	5	2.5	10	1.9
	全体	7	1	5	2.4	17	1.9
(5) 高張アルブミン製剤25% (5.0g/20 mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(6) 高張アルブミン製剤25% (12.5g/50 mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	2	1	1	1.0	2	0.0
	300～499床	1	1	1	1.0	1	—
	500床以上	2	2	2	2.0	4	0.0
	全体	5	1	2	1.4	7	0.5

【特別集計：アルブミン製剤廃棄量(g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤(5%)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	3	13	38	25.0	75	12.5
	300～499床	4	13	25	18.8	75	7.2
	500床以上	4	13	50	28.1	113	18.8
	全体	11	13	50	23.9	263	13.1
(2) 高張アルブミン製剤(20%)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	10	10	10.0	10	—
	300～499床	2	10	50	30.0	60	28.3
	500床以上	4	10	50	25.0	100	19.1
	全体	7	10	50	24.3	170	19.0
(3) 高張アルブミン製剤(25%)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	2	13	13	12.5	25	0.0
	300～499床	1	13	13	12.5	13	—
	500床以上	2	25	25	25.0	50	0.0
	全体	5	13	25	17.5	88	6.8
(4) アルブミン製剤	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	5	10	50	22.0	110	16.7
	300～499床	7	10	50	21.1	148	14.2
	500床以上	7	10	60	37.5	263	16.3
	全体	19	10	60	27.4	520	16.8

1-49. 2019年4月～2020年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を使用せずに廃棄しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	0	0.0%	5	20.0%	1	4.0%	3	12.0%	9	36.0%
2	廃棄していない	0	0.0%	5	20.0%	7	28.0%	4	16.0%	16	64.0%
	回答施設合計	0		10		8		7		25	

1-50. 2019年4月～2020年3月の期間で使用せずに廃棄した免疫グロブリン製剤(静注)の本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:静注5% (0.5g/10mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) 免疫グロブリン製剤:静注5% (1.0g/20mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) 免疫グロブリン製剤:静注5% (2.5g/50mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	3	1	2	1.3	4	0.6
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	2	1	1	1.0	2	0.0
	全体	5	1	2	1.2	6	0.4
(4) 免疫グロブリン製剤:静注5% (5.0g/100mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	1	1	1.0	1	—
	500床以上	1	1	1	1.0	1	—
	全体	2	1	1	1.0	2	0.0
(5) 免疫グロブリン製剤:静注5% (10.0g/200mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(6) 免疫グロブリン製剤:静注10% (0.5g/5mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	1	1	1.0	1	—
	全体	1	1	1	1.0	1	—
(7) 免疫グロブリン製剤:静注10% (2.5g/25mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	2	2	2.0	2	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	2	2	2.0	2	—

1-50. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(8) 免疫グロブリン製剤: 静注10% (5.0g/50mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(9) 免疫グロブリン製剤: 静注10% (10.0g/100mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(10) 免疫グロブリン製剤: 静注10% (20.0g/200mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

【特別集計: 免疫グロブリン製剤(静注)廃棄量(g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	4	3	5	3.8	15	1.4
	300~499床	1	5	5	5.0	5	—
	500床以上	3	3	6	3.5	11	1.7
	全体	8	3	6	3.8	31	1.4

1-51. 2019年4月~2020年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)を使用せずに廃棄しましたか

番号	項目	0床		1~299床		300~499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	4.0%	2	8.0%
2	廃棄していない	0	0.0%	10	40.0%	7	28.0%	6	24.0%	23	92.0%
	回答施設合計	0		11		7		7		25	

1-52. 2019年4月～2020年3月の期間で使用せずに廃棄した免疫グロブリン製剤(皮下注)の本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:皮下注20% (1.0g/5mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	2	2	2.0	2	—
	全体	1	2	2	2.0	2	—
(2) 免疫グロブリン製剤:皮下注20% (2.0g/10mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) 免疫グロブリン製剤:皮下注20% (4.0g/20mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

【特別集計:免疫グロブリン製剤(皮下注)廃棄量(g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	2	2	2.0	2	—
	全体	1	2	2	2.0	2	—

【2】輸血療法の体制について

2-1) 血液製剤の管理について

1-53. 輸血検査を行っている部門はどこですか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	0	0.0%	1	0.6%	1	0.6%	9	5.0%	11	6.1%
2	検査部門	9	5.0%	77	42.5%	13	7.2%	6	3.3%	105	58.0%
3	院外の検査機関に委託	25	13.8%	36	19.9%	0	0.0%	0	0.0%	61	33.7%
4	その他	1	0.6%	3	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.2%
	回答施設合計	35		117		14		15		181	

1-54. 輸血用血液製剤を管理している部門はどこですか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	3	1.7%	4	2.2%	1	0.6%	9	5.1%	17	9.6%
2	検査部門	10	5.6%	71	39.9%	13	7.3%	6	3.4%	100	56.2%
3	院外の検査機関に委託	4	2.2%	5	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.1%
4	その他	15	8.4%	37	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	52	29.2%
	回答施設合計	32		117		14		15		178	

1-55. 輸血用血液製剤を保管する保冷库について選択してください。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液専用保冷库 (自記式記録計付き、警報装置付き)	4	2.2%	66	36.7%	14	7.8%	15	8.3%	99	55.0%
2	血液専用保冷库 (自記式記録計付き)	1	0.6%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.7%
3	血液専用保冷库 (自記式記録計なし、警報装置なし)	0	0.0%	3	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.7%
4	薬品保冷库 (自記式記録計付き、警報装置付き)	5	2.8%	4	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.0%
5	薬品保冷库 (自記式記録計付き)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	薬品保冷库 (自記式記録計なし、警報装置なし)	8	4.4%	13	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	21	11.7%
7	家庭用冷蔵・冷凍庫	16	8.9%	24	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	40	22.2%
8	その他	1	0.6%	4	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.8%
	回答施設合計	35		116		14		15		180	

1-56. 一般病棟で輸血用血液製剤の一時保管はありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	2	1.1%	37	20.8%	2	1.1%	3	1.7%	44	24.7%
2	いいえ	27	15.2%	78	43.8%	12	6.7%	12	6.7%	129	72.5%
3	その他	3	1.7%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.8%
	回答施設合計	32		117		14		15		178	

1-57. 新鮮凍結人血漿についてお伺いします。新鮮凍結人血漿を扱っていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	2	1.1%	66	36.9%	14	7.8%	15	8.4%	97	54.2%
2	いいえ	33	18.4%	49	27.4%	0	0.0%	0	0.0%	82	45.8%
	回答施設合計	35		115		14		15		179	

1-58. 問1-57で“はい”と回答された施設についてお伺いします。新鮮凍結人血漿融解を担当する部門はどこですか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部(輸血管理部門)	0	0.0%	20	20.6%	10	10.3%	9	9.3%	39	40.2%
2	病棟	0	0.0%	37	38.1%	4	4.1%	5	5.2%	46	47.4%
3	その他	2	2.1%	9	9.3%	0	0.0%	1	1.0%	12	12.4%
	回答施設合計	2		66		14		15		97	

1-59. 新鮮凍結人血漿融解後、使用までの管理についてお伺いします。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	融解後、直ちに投与	2	2.1%	60	62.5%	13	13.5%	13	13.5%	88	91.7%
2	融解後、専用保冷庫(2～6℃)で保管	0	0.0%	3	3.1%	1	1.0%	2	2.1%	6	6.3%
3	融解後、汎用(非専用)保冷庫(2～6℃)で保管	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
4	融解後、室温で保管	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	2		65		14		15		96	

1-60. 輸血用血液製剤の運搬について伺います。院内で輸血用血液製剤を運搬する容器について選択してください。

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発泡スチロールの容器	10	5.3%	28	14.9%	2	1.1%	2	1.1%	42	22.3%
2	クーラーボックス	5	2.7%	21	11.2%	7	3.7%	5	2.7%	38	20.2%
3	ビニール製の搬送バック	7	3.7%	23	12.2%	5	2.7%	9	4.8%	44	23.4%
4	血液搬送装置 (ポータブル保冷装置;ATR)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	13	6.9%	48	25.5%	2	1.1%	1	0.5%	64	34.0%
	回答施設合計	35		120		16		17		188	

1-61. 院内に血液搬送装置(ポータブル保冷装置;ATRなど)を導入していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.1%	2	1.1%
2	導入を検討している	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	1	0.6%	3	1.7%
3	導入の予定なし	33	19.0%	110	63.2%	14	8.0%	12	6.9%	169	97.1%
4	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	33		112		14		15		174	

1-62. 輸血責任医師(輸血業務担当や責任者として病院等から任命されている医師)はいますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる(専任)	3	1.7%	2	1.1%	3	1.7%	5	2.9%	13	7.4%
2	いる(兼任)	8	4.6%	50	28.6%	10	5.7%	8	4.6%	76	43.4%
3	いない	21	12.0%	62	35.4%	1	0.6%	2	1.1%	86	49.1%
	回答施設合計	32		114		14		15		175	

1-63. 貴施設に臨床検査技師はいますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	15	8.7%	93	53.8%	14	8.1%	15	8.7%	137	79.2%
2	いない	14	8.1%	22	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	36	20.8%
	回答施設合計	29		115		14		15		173	

1-64. 臨床検査技師の配置状況について

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	平日のみ日勤帯配置 (夜間オンコール無し)	11	8.0%	19	13.9%	0	0.0%	1	0.7%	31	22.6%
2	平日のみ日勤帯配置 (夜間オンコール有り)	2	1.5%	39	28.5%	0	0.0%	0	0.0%	41	29.9%
3	全日勤務のみ配置 (夜間オンコール無し)	2	1.5%	7	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	6.6%
4	全日勤務のみ配置 (夜間オンコール有り)	0	0.0%	12	8.8%	1	0.7%	0	0.0%	13	9.5%
5	24時間体制で配置	0	0.0%	12	8.8%	13	9.5%	13	9.5%	38	27.7%
6	必要時のみ配置	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	0.7%
7	その他	0	0.0%	4	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.9%
	回答施設合計	15		93		14		15		137	

1-65. 輸血検査業務全体を担当し責任を持つ臨床検査技師「輸血担当技師」はいますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる(専任)	0	0.0%	5	3.7%	9	6.7%	14	10.4%	28	20.7%
2	いる(兼任)	4	3.0%	42	31.1%	5	3.7%	1	0.7%	52	38.5%
3	いない	11	8.1%	44	32.6%	0	0.0%	0	0.0%	55	40.7%
	回答施設合計	15		91		14		15		135	

1-66. 輸血療法委員会又は同様の機能を持つ委員会はありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	7	4.0%	64	36.6%	14	8.0%	15	8.6%	100	57.1%
2	ない	24	13.7%	51	29.1%	0	0.0%	0	0.0%	75	42.9%
	回答施設合計	31		115		14		15		175	

1-67. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血療法委員会の開催回数は

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	0回	1	1.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
2	1～5回	2	2.0%	12	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	14	14.1%
3	6回	0	0.0%	26	26.3%	11	11.1%	13	13.1%	50	50.5%
4	7回以上	4	4.0%	24	24.2%	3	3.0%	2	2.0%	33	33.3%
	回答施設合計	7		63		14		15		99	

1-68. 委員の出席率は何%でしょうか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ほぼ100%	2	2.1%	19	19.6%	1	1.0%	3	3.1%	25	25.8%
2	81～99%	4	4.1%	27	27.8%	5	5.2%	6	6.2%	42	43.3%
3	61～80%	0	0.0%	12	12.4%	6	6.2%	5	5.2%	23	23.7%
4	41～60%	0	0.0%	3	3.1%	2	2.1%	1	1.0%	6	6.2%
5	21～40%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	0～20%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	回答施設合計	6		62		14		15		97	

2-2) 輸血関連の検査体制について

1-69. 日中勤務時間帯(各施設の定める所定労働時間における夜間・休日を除く日中の勤務時間帯を指す)のABO血液型検査・RhD血液型検査の実施者全てを回答してください 複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	2	1.0%	5	2.5%	1	0.5%	9	4.4%	17	8.3%
2	検査部門の臨床検査技師	5	2.5%	67	32.8%	12	5.9%	7	3.4%	91	44.6%
3	院内の検査センター技師	0	0.0%	5	2.5%	1	0.5%	0	0.0%	6	2.9%
4	看護師	0	0.0%	5	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.5%
5	担当医	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
6	院外の検査機関に委託	24	11.8%	53	26.0%	1	0.5%	0	0.0%	78	38.2%
7	検査を実施していない	3	1.5%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.5%
8	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	35		138		15		16		204	

1-70. 夜間・休日勤務時間帯のABO血液型検査・RhD血液型検査の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	0	0.0%	4	1.9%	1	0.5%	8	3.8%	13	6.1%
2	検査部門の臨床検査技師	5	2.4%	57	26.9%	14	6.6%	15	7.1%	91	42.9%
3	院内の検査センター技師	0	0.0%	3	1.4%	1	0.5%	0	0.0%	4	1.9%
4	看護師	0	0.0%	7	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.3%
5	担当医	1	0.5%	6	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.3%
6	院外の検査機関に委託	9	4.2%	34	16.0%	1	0.5%	0	0.0%	44	20.8%
7	検査を実施していない	20	9.4%	24	11.3%	0	0.0%	0	0.0%	44	20.8%
8	その他	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%
	回答施設合計	35		137		17		23		212	

1-71. 日中勤務時間帯の不規則抗体スクリーニング検査の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	1	0.5%	4	2.2%	1	0.5%	9	4.9%	15	8.1%
2	検査部門の臨床検査技師	2	1.1%	34	18.4%	11	5.9%	6	3.2%	53	28.6%
3	院内の検査センター技師	0	0.0%	2	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	3	1.6%
4	看護師	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.1%
5	担当医	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
6	院外の検査機関に委託	25	13.5%	64	34.6%	1	0.5%	0	0.0%	90	48.6%
7	検査を実施していない	6	3.2%	15	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	21	11.4%
8	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	35		121		14		15		185	

1-72. 夜間・休日勤務時間帯の不規則抗体スクリーニング検査の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	6	3.2%	9	4.7%
2	検査部門の臨床検査技師	1	0.5%	30	15.8%	12	6.3%	11	5.8%	54	28.4%
3	院内の検査センター技師	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.1%
4	看護師	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
5	担当医	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
6	院外の検査機関に委託	10	5.3%	42	22.1%	1	0.5%	0	0.0%	53	27.9%
7	検査を実施していない	23	12.1%	42	22.1%	1	0.5%	3	1.6%	69	36.3%
8	その他	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	回答施設合計	35		120		15		20		190	

1-73. 日中勤務時間帯の交差適合試験の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	1	0.5%	6	3.2%	1	0.5%	9	4.8%	17	9.1%
2	検査部門の臨床検査技師	7	3.7%	72	38.5%	12	6.4%	7	3.7%	98	52.4%
3	院内の検査センター技師	0	0.0%	5	2.7%	1	0.5%	0	0.0%	6	3.2%
4	看護師	0	0.0%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.1%
5	担当医	1	0.5%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.7%
6	院外の検査機関に委託	22	11.8%	30	16.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	27.8%
7	検査を実施していない	3	1.6%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.1%
8	その他	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	回答施設合計	35		122		14		16		187	

1-74. 夜間・休日勤務時間帯の交差適合試験の実施者全てを回答してください

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	1	0.5%	4	2.0%	0	0.0%	8	4.0%	13	6.5%
2	検査部門の臨床検査技師	5	2.5%	61	30.7%	14	7.0%	15	7.5%	95	47.7%
3	院内の検査センター技師	0	0.0%	4	2.0%	1	0.5%	0	0.0%	5	2.5%
4	看護師	0	0.0%	5	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.5%
5	担当医	1	0.5%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.0%
6	院外の検査機関に委託	8	4.0%	29	14.6%	0	0.0%	0	0.0%	37	18.6%
7	検査を実施していない	20	10.1%	18	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	19.1%
8	その他	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	回答施設合計	36		125		15		23		199	

1-75. 血液型検査で行っている主な検査方法は

番号	項目	複数回答									
		0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	8	4.1%	78	39.8%	3	1.5%	7	3.6%	96	49.0%
2	カラム凝集法	7	3.6%	19	9.7%	12	6.1%	14	7.1%	52	26.5%
3	マイクロプレート法	6	3.1%	15	7.7%	1	0.5%	0	0.0%	22	11.2%
4	その他(不明)	13	6.6%	13	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	26	13.3%
	回答施設合計	34		125		16		21		196	

1-76. 血液型検査で行っている検査内容は

番号	項目	複数回答									
		0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	抗A、抗B試薬によるオモテ検査	20	4.7%	103	24.0%	14	3.3%	15	3.5%	152	35.3%
2	A血球、B血球によるウラ検査	16	3.7%	94	21.9%	14	3.3%	15	3.5%	139	32.3%
3	抗D試薬を用いたD抗原検査	14	3.3%	96	22.3%	14	3.3%	15	3.5%	139	32.3%
	回答施設合計	50		293		42		45		430	

1-77. 血液型検査の二重チェックを同一患者の異なる時点での2検体で行い、同一検体については異なる2人の検査者がそれぞれに検査していますか

番号	項目	複数回答									
		0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については2人の検査者がそれぞれに検査している(日勤帯・夜勤帯両方)	2	1.3%	12	7.6%	6	3.8%	6	3.8%	26	16.6%
2	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については2人の検査者がそれぞれに検査している(日勤帯のみ)	3	1.9%	18	11.5%	0	0.0%	2	1.3%	23	14.6%
3	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については実施していない(日勤帯・夜勤帯両方)	0	0.0%	10	6.4%	8	5.1%	6	3.8%	24	15.3%
4	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については実施していない(日勤帯のみ)	2	1.3%	4	2.5%	0	0.0%	1	0.6%	7	4.5%
5	原則、同一患者の異なる時点での2検体では実施せず、同一検体については2人の検査者がそれぞれに検査している(日勤帯・夜勤帯両方)	2	1.3%	12	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	14	8.9%
6	原則、同一患者の異なる時点での2検体では実施せず、同一検体については2人の検査者がそれぞれに検査している(日勤帯のみ)	1	0.6%	18	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	19	12.1%
7	どちらも実施していない	12	7.6%	32	20.4%	0	0.0%	0	0.0%	44	28.0%
	回答施設合計	22		106		14		15		157	

1-78. 不規則抗体スクリーニング検査で行っている主な検査方法は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	4	2.5%	25	15.8%	2	1.3%	5	3.2%	36	22.8%
2	カラム凝集法	6	3.8%	42	26.6%	12	7.6%	14	8.9%	74	46.8%
3	マイクロプレート法	1	0.6%	4	2.5%	1	0.6%	0	0.0%	6	3.8%
4	その他(不明)	18	11.4%	24	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	42	26.6%
	回答施設合計	29		95		15		19		158	

1-79. 不規則抗体スクリーニング検査で行っている検査内容は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	生理食塩液法	5	2.0%	29	11.4%	3	1.2%	4	1.6%	41	16.1%
2	酵素法	7	2.7%	42	16.5%	10	3.9%	11	4.3%	70	27.5%
3	間接抗グロブリン法	8	3.1%	64	25.1%	14	5.5%	15	5.9%	101	39.6%
4	その他(不明)	16	6.3%	27	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	43	16.9%
	回答施設合計	36		162		27		30		255	

1-80. 交差適合試験で行っている主な検査方法は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	9	5.2%	74	42.5%	4	2.3%	8	4.6%	95	54.6%
2	カラム凝集法	5	2.9%	20	11.5%	10	5.7%	13	7.5%	48	27.6%
3	固相法	1	0.6%	2	1.1%	1	0.6%	0	0.0%	4	2.3%
4	その他(不明)	15	8.6%	12	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	27	15.5%
	回答施設合計	30		108		15		21		174	

1-81. 交差適合試験で行っている検査内容は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	生理食塩液法	13	4.3%	73	24.1%	5	1.7%	8	2.6%	99	32.7%
2	酵素法	10	3.3%	36	11.9%	1	0.3%	1	0.3%	48	15.8%
3	間接抗グロブリン法	11	3.6%	89	29.4%	14	4.6%	15	5.0%	129	42.6%
4	その他(不明)	13	4.3%	13	4.3%	0	0.0%	1	0.3%	27	8.9%
	回答施設合計	47		211		20		25		303	

1-82. 2019年4月～2020年3月の期間で臨床検査技師以外の職員が交差適合試験を行って、赤血球輸血を施行した症例はありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	3	1.8%	6	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.5%
2	ない	26	15.8%	99	60.0%	13	7.9%	15	9.1%	153	92.7%
3	不明	1	0.6%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%
	回答施設合計	30		107		13		15		165	

1-83. 緊急輸血時など血液型が確定できない時には、交差適合試験を省略してO型 赤血球液を使用していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用している	0	0.0%	3	1.8%	6	3.6%	11	6.5%	20	11.9%
2	使用していない	27	16.1%	77	45.8%	0	0.0%	0	0.0%	104	61.9%
3	未だ使用していないが、 マニュアルで使用を明記	2	1.2%	29	17.3%	7	4.2%	4	2.4%	42	25.0%
4	不明	1	0.6%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%
	回答施設合計	30		110		13		15		168	

交差適合試験を省略してO型 赤血球を使用した症例数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	—	—	—	—	—
1～299床	1	1	1	1.0	1	—
300～499床	4	1	10	4.5	18	3.9
500床以上	8	1	56	23.1	185	19.3
全体	13	1	56	15.7	204	17.8

1-84. 緊急輸血時など血液型が確定できない時には、AB型 新鮮凍結人血漿を使用していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用している	0	0.0%	3	1.8%	5	2.9%	10	5.9%	18	10.6%
2	使用していない	29	17.1%	79	46.5%	1	0.6%	0	0.0%	109	64.1%
3	未だ使用していないが、マニュアルで使用を明記	1	0.6%	27	15.9%	8	4.7%	5	2.9%	41	24.1%
4	不明	1	0.6%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%
	回答施設合計	31		110		14		15		170	

AB型 新鮮凍結人血漿を使用した症例数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	－	－	－	－	－
1～299床	1	1	1	1.0	1	－
300～499床	4	1	7	3.0	12	2.7
500床以上	6	5	24	14.8	89	6.4
全体	11	1	24	9.3	102	8.0

1-85. 血液型が確定しているが緊急輸血時などに、ABO血液型同型赤血球液を、交差適合試験を省略して使用していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用している	0	0.0%	8	4.6%	8	4.6%	11	6.4%	27	15.6%
2	使用していない	29	16.8%	75	43.4%	1	0.6%	1	0.6%	106	61.3%
3	未だ使用していないが、マニュアルで使用を明記	2	1.2%	27	15.6%	5	2.9%	3	1.7%	37	21.4%
4	不明	1	0.6%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.7%
	回答施設合計	32		112		14		15		173	

ABO血液型同型赤血球液を、交差適合試験を省略して使用した症例数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	－	－	－	－	－
1～299床	5	1	4	1.6	8	1.3
300～499床	5	1	21	7.6	38	8.4
500床以上	8	1	65	22.9	183	18.9
全体	18	1	65	12.7	229	16.0

1-86. ABO血液型、RhD血液、不規則抗体スクリーニングを事前に行い、臨床的に問題となる抗体が検出されない場合に、赤血球輸血時にコンピュータークロスマッチを実施していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	すべての症例で実施している	0	0.0%	3	1.8%	2	1.2%	3	1.8%	8	4.8%
2	T&S(type and screen)症例のみ実施している	0	0.0%	1	0.6%	1	0.6%	3	1.8%	5	3.0%
3	手術時の追加依頼の場合に実施している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	実施していない	28	16.7%	100	59.5%	11	6.5%	7	4.2%	146	86.9%
5	その他	2	1.2%	5	3.0%	0	0.0%	2	1.2%	9	5.4%
	回答施設合計	30		109		14		15		168	

2-3) 輸血前の検体保管状況と感染症検査の実施状況について

1-87. 輸血前検体の保存について

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	原則的に全ての患者さんの検体を凍結保存している	8	4.5%	68	38.4%	14	7.9%	15	8.5%	105	59.3%
2	原則的に全ての患者さんの検体を冷蔵保存している	2	1.1%	9	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	11	6.2%
3	特別な場合以外、ほとんど保存していない	3	1.7%	8	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	11	6.2%
4	保存していない	21	11.9%	29	16.4%	0	0.0%	0	0.0%	50	28.2%
	回答施設合計	34		114		14		15		177	

1-88. 検体保存期間は

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	1.0ヶ月～6.0ヶ月	3	2.7%	8	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	11	9.7%
2	6.1ヶ月～12.0ヶ月	0	0.0%	4	3.5%	0	0.0%	1	0.9%	5	4.4%
3	12.1ヶ月～24.0ヶ月	4	3.5%	28	24.8%	5	4.4%	8	7.1%	45	39.8%
4	24.1ヶ月以上(永久保存を除く)	2	1.8%	31	27.4%	9	8.0%	4	3.5%	46	40.7%
5	永久保存	1	0.9%	4	3.5%	0	0.0%	1	0.9%	6	5.3%
	回答施設合計	10		75		14		14		113	

1-89. 輸血前検体保存の方法について

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液型検査や交差適合試験の残りをそのまま保存している	5	4.4%	54	47.8%	5	4.4%	5	4.4%	69	61.1%
2	血液型検査や交差適合試験の残りを核酸検査に適合する試験管などに入れ保存している	1	0.9%	10	8.8%	3	2.7%	3	2.7%	17	15.0%
3	専用の採血管に採血し未開封のまま保存している	3	2.7%	9	8.0%	4	3.5%	4	3.5%	20	17.7%
4	その他	1	0.9%	3	2.7%	1	0.9%	2	1.8%	7	6.2%
	回答施設合計	10		76		13		14		113	

1-90. 輸血前に感染症マーカーの検査(輸血前感染症検査)を行っていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血前検査として、原則として全ての症例で行っている	8	4.5%	27	15.2%	5	2.8%	7	3.9%	47	26.4%
2	輸血前検査として、症例によって行っている	3	1.7%	7	3.9%	0	0.0%	2	1.1%	12	6.7%
3	入院時検査や術前検査と合わせて行っている	10	5.6%	69	38.8%	9	5.1%	6	3.4%	94	52.8%
4	行っていない	13	7.3%	12	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	25	14.0%
	回答施設合計	34		115		14		15		178	

1-91. 輸血前に実施している感染症検査の項目は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	HBs抗原(*)	17	3.4%	100	19.9%	14	2.8%	14	2.8%	145	28.9%
2	HBs抗体(*)	10	2.0%	35	7.0%	7	1.4%	9	1.8%	61	12.2%
3	HBc抗体(*)	5	1.0%	20	4.0%	4	0.8%	7	1.4%	36	7.2%
4	HBe抗原	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.4%
5	HBe抗体	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	3	0.6%
6	HBV-DNA核酸増幅検査	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	HCV抗体(*)	18	3.6%	100	19.9%	14	2.8%	14	2.8%	146	29.1%
8	HCVコア抗原(*)	1	0.2%	13	2.6%	4	0.8%	4	0.8%	22	4.4%
9	HCV-RNA核酸増幅検査	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
10	HIV抗体(*)	3	0.6%	18	3.6%	8	1.6%	5	1.0%	34	6.8%
11	HIV抗原／HIV抗体同時測定	4	0.8%	26	5.2%	6	1.2%	7	1.4%	43	8.6%
12	HTLV-I 抗体	1	0.2%	7	1.4%	0	0.0%	1	0.2%	9	1.8%
	回答施設合計	63		319		57		63		502	

(*)厚生労働省の推奨する検査項目

2-4) 輸血後の検体保管状況と感染症検査の実施状況について

1-92. 輸血後検体の保存について

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	原則的に全ての患者さんの検体を凍結保存している	3	1.7%	16	9.1%	3	1.7%	1	0.6%	23	13.1%
2	原則的に全ての患者さんの検体を冷蔵保存している	2	1.1%	7	4.0%	1	0.6%	2	1.1%	12	6.9%
3	特別な場合以外、ほとんど保存していない	3	1.7%	20	11.4%	5	2.9%	4	2.3%	32	18.3%
4	保存していない	24	13.7%	71	40.6%	5	2.9%	8	4.6%	108	61.7%
	回答施設合計	32		114		14		15		175	

1-93. 検体保存期間は

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	1.0ヶ月～6.0ヶ月	0	0.0%	7	21.9%	0	0.0%	1	3.1%	8	25.0%
2	6.1ヶ月～12.0ヶ月	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%
3	12.1ヶ月～24.0ヶ月	2	6.3%	4	12.5%	3	9.4%	0	0.0%	9	28.1%
4	24.1ヶ月以上(永久保存を除く)	2	6.3%	9	28.1%	1	3.1%	1	3.1%	13	40.6%
5	永久保存	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	1	3.1%
	回答施設合計	4		21		4		3		32	

1-94. 輸血後検体保存の方法について

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	検査の残りをそのまま保存している	2	5.7%	17	48.6%	2	5.7%	3	8.6%	24	68.6%
2	検査の残りを核酸検査に適合する試験管などに入れ保存している	0	0.0%	3	8.6%	1	2.9%	0	0.0%	4	11.4%
3	専用の採血管に採血し未開封のまま保存している	2	5.7%	2	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.4%
4	その他	1	2.9%	1	2.9%	1	2.9%	0	0.0%	3	8.6%
	回答施設合計	5		23		4		3		35	

1-95. 輸血後に感染症マーカーの検査(輸血後感染症検査)を行っていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	原則として全ての症例で行っている	12	6.8%	41	23.2%	7	4.0%	3	1.7%	63	35.6%
2	症例によって行っている	3	1.7%	32	18.1%	6	3.4%	12	6.8%	53	29.9%
3	行っていない	18	10.2%	42	23.7%	1	0.6%	0	0.0%	61	34.5%
	回答施設合計	33		115		14		15		177	

1-96. 輸血後に実施している感染症検査の項目は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	HBs抗原	8	2.2%	32	8.7%	4	1.1%	5	1.4%	49	13.3%
2	HBs抗体	3	0.8%	10	2.7%	2	0.5%	2	0.5%	17	4.6%
3	HBc抗体	2	0.5%	1	0.3%	1	0.3%	2	0.5%	6	1.6%
4	HBe抗原	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%	3	0.8%
5	HBe抗体	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.5%
6	HBV-DNA核酸増幅検査(*)	7	1.9%	43	11.7%	10	2.7%	12	3.3%	72	19.6%
7	HCV抗体	7	1.9%	31	8.4%	3	0.8%	5	1.4%	46	12.5%
8	HCVコア抗原(*)	7	1.9%	43	11.7%	10	2.7%	11	3.0%	71	19.3%
9	HCV-RNA核酸増幅検査	1	0.3%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.5%	5	1.4%
10	HIV抗体(*)	2	0.5%	23	6.3%	9	2.4%	8	2.2%	42	11.4%
11	HIV抗原/HIV抗体同時測定	7	1.9%	33	9.0%	5	1.4%	8	2.2%	53	14.4%
12	HTLV-I 抗体	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.5%
	回答施設合計	46		219		45		58		368	

(*)厚生労働省の推奨する検査項目

2-5) 輸血製剤の適正使用について

1-97. 赤血球製剤において国の使用基準を遵守している割合を把握していますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	把握している	7	4.3%	20	12.4%	1	0.6%	4	2.5%	32	19.9%
2	把握していない	26	16.1%	81	50.3%	12	7.5%	10	6.2%	129	80.1%
	回答施設合計	33		101		13		14		161	

赤血球製剤において国の使用基準を遵守している割合(%)						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	7	70	100	90.7	635	12.4
1～299床	16	60	100	92.4	1,479	11.8
300～499床	1	90	90	90.0	90	—
500床以上	3	80	80	80.0	240	0.0
全体	27	60	100	90.5	2,444	11.4

1-98. 血小板製剤において国の使用基準を遵守している割合を把握していますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	把握している	2	1.3%	15	9.9%	1	0.7%	3	2.0%	21	13.9%
2	把握していない	26	17.2%	82	54.3%	12	7.9%	10	6.6%	130	86.1%
	回答施設合計	28		97		13		13		151	

血小板製剤において国の使用基準を遵守している割合(%)						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	2	100	100	100.0	200	0.0
1～299床	11	50	100	90.9	1,000	15.8
300～499床	1	90	90	90.0	90	—
500床以上	3	80	95	85.0	255	8.7
全体	17	50	100	90.9	1,545	13.5

1-99. 血漿製剤において国の使用基準を遵守している割合を把握していますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	把握している	2	1.3%	15	9.9%	1	0.7%	4	2.6%	22	14.6%
2	把握していない	25	16.6%	82	54.3%	12	7.9%	10	6.6%	129	85.4%
	回答施設合計	27		97		13		14		151	

血漿製剤において国の使用基準を遵守している割合(%)						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	2	100	100	100.0	200	0.0
1～299床	11	40	100	83.6	920	25.0
300～499床	1	60	60	60.0	60	－
500床以上	3	80	90	83.3	250	5.8
全体	17	40	100	84.1	1,430	21.5

1-100. アルブミン製剤において国の使用基準を遵守している割合を把握していますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	把握している	4	2.6%	20	13.2%	1	0.7%	3	2.0%	28	18.4%
2	把握していない	23	15.1%	78	51.3%	12	7.9%	11	7.2%	124	81.6%
	回答施設合計	27		98		13		14		152	

アルブミン製剤において国の使用基準を遵守している割合(%)						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	4	100	100	100.0	400	0.0
1～299床	15	80	100	96.6	1,449	7.2
300～499床	1	70	70	70.0	70	－
500床以上	2	70	80	75.0	150	7.1
全体	22	70	100	94.0	2,069	10.5

1-101. 免疫グロブリン製剤において国の使用基準を遵守している割合を把握していますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	把握している	2	1.4%	17	12.0%	1	0.7%	3	2.1%	23	16.2%
2	把握していない	24	16.9%	74	52.1%	11	7.7%	10	7.0%	119	83.8%
	回答施設合計	26		91		12		13		142	

免疫グロブリン製剤において国の使用基準を遵守している割合(%)						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	2	100	100	100.0	200	0.0
1～299床	11	75	100	94.9	1,044	9.2
300～499床	1	100	100	100.0	100	－
500床以上	1	80	80	80.0	80	－
全体	15	75	100	94.9	1,424	9.0

1-103. 上記の97～101の設問で1つでも「(2) 把握していない」と回答された方へ、適正使用に向けて検討していることがありますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	1	0.8%	9	7.4%	4	3.3%	6	5.0%	20	16.5%
2	ない	22	18.2%	68	56.2%	6	5.0%	5	4.1%	101	83.5%
	回答施設合計	23		77		10		11		121	

1-104. 適正使用推進について病院全体で取り組み、効果の出ていることがありますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	1	0.7%	18	13.0%	2	1.4%	5	3.6%	26	18.8%
2	ない	21	15.2%	74	53.6%	9	6.5%	8	5.8%	112	81.2%
	回答施設合計	22		92		11		13		138	

1-105. 赤血球製剤において検査データ上での不適正なオーダーに対して確認の問い合わせをしていますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ほとんどしている	3	2.0%	26	17.1%	2	1.3%	2	1.3%	33	21.7%
2	頻回にしている	0	0.0%	3	2.0%	1	0.7%	4	2.6%	8	5.3%
3	時々している	4	2.6%	24	15.8%	5	3.3%	7	4.6%	40	26.3%
4	していない	19	12.5%	39	25.7%	3	2.0%	1	0.7%	62	40.8%
5	その他	2	1.3%	6	3.9%	1	0.7%	0	0.0%	9	5.9%
	回答施設合計	28		98		12		14		152	

1-106. 血小板製剤において検査データ上での不適正なオーダーに対して確認の問い合わせをしていますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ほとんどしている	1	0.7%	22	15.1%	3	2.1%	3	2.1%	29	19.9%
2	頻回にしている	0	0.0%	2	1.4%	1	0.7%	3	2.1%	6	4.1%
3	時々している	0	0.0%	11	7.5%	4	2.7%	7	4.8%	22	15.1%
4	していない	19	13.0%	51	34.9%	3	2.1%	1	0.7%	74	50.7%
5	その他	5	3.4%	9	6.2%	1	0.7%	0	0.0%	15	10.3%
	回答施設合計	25		95		12		14		146	

1-107. 血漿製剤において検査データ上での不適正なオーダーに対して確認の問い合わせをしていますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ほとんどしている	1	0.7%	22	15.1%	2	1.4%	2	1.4%	27	18.5%
2	頻回にしている	0	0.0%	2	1.4%	0	0.0%	4	2.7%	6	4.1%
3	時々している	0	0.0%	10	6.8%	5	3.4%	6	4.1%	21	14.4%
4	していない	19	13.0%	53	36.3%	4	2.7%	2	1.4%	78	53.4%
5	その他	5	3.4%	8	5.5%	1	0.7%	0	0.0%	14	9.6%
	回答施設合計	25		95		12		14		146	

1-108. アルブミン製剤において検査データ上での不適正なオーダーに対して確認の問い合わせをしていますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ほとんどしている	1	0.7%	22	15.6%	1	0.7%	0	0.0%	24	17.0%
2	頻回にしている	0	0.0%	3	2.1%	1	0.7%	2	1.4%	6	4.3%
3	時々している	0	0.0%	9	6.4%	5	3.5%	4	2.8%	18	12.8%
4	していない	19	13.5%	49	34.8%	4	2.8%	8	5.7%	80	56.7%
5	その他	5	3.5%	8	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	13	9.2%
	回答施設合計	25		91		11		14		141	

1-109. 赤血球、血小板、血漿、アルブミン製剤の中で検査データから不適正かどうかを判断するのが難しい製剤がありますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	1	0.7%	25	17.7%	8	5.7%	13	9.2%	47	33.3%
2	ない	21	14.9%	68	48.2%	3	2.1%	2	1.4%	94	66.7%
	回答施設合計	22		93		11		15		141	

1-110. 問1-109で「(1)ある」と回答された方へ、その製剤はどれですか。

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	赤血球製剤	1	1.1%	9	10.3%	1	1.1%	6	6.9%	17	19.5%
2	血小板製剤	0	0.0%	5	5.7%	1	1.1%	7	8.0%	13	14.9%
3	血漿製剤	1	1.1%	14	16.1%	6	6.9%	10	11.5%	31	35.6%
4	アルブミン製剤	0	0.0%	16	18.4%	3	3.4%	7	8.0%	26	29.9%
	回答施設合計	2		44		11		30		87	

1-111. 貴院の輸血部門システムには血算、アルブミン値、凝固検査値が表示されますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	全て表示される	5	3.8%	21	15.8%	3	2.3%	3	2.3%	32	24.1%
2	一部のみ表示される	5	3.8%	13	9.8%	3	2.3%	3	2.3%	24	18.0%
3	表示されない	12	9.0%	50	37.6%	6	4.5%	9	6.8%	77	57.9%
	回答施設合計	22		84		12		15		133	

1-112. 問1-111で「(1)、(2)」と回答された方へ、不適正輸血疑いと判断するための基準値を設定していますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	設定している	2	3.6%	8	14.5%	0	0.0%	0	0.0%	10	18.2%
2	設定していない	7	12.7%	20	36.4%	4	7.3%	5	9.1%	36	65.5%
3	個人の判断に任されている	0	0.0%	6	10.9%	2	3.6%	1	1.8%	9	16.4%
	回答施設合計	9		34		6		6		55	

1-113. 問1-112で「(1)、設定している」と回答された方へ、基準値範囲外のオーダーがされた場合のアラート表示はありますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%
2	一部あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	ない	1	10.0%	7	70.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	80.0%
	回答施設合計	2		8		0		0		10	

1-114. 輸血オーダー時の必須項目をご教示下さい。

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	病名	6	2.9%	29	13.9%	4	1.9%	6	2.9%	45	21.6%
2	輸血目的(理由)	18	8.7%	64	30.8%	10	4.8%	14	6.7%	106	51.0%
3	検査データ	17	8.2%	38	18.3%	1	0.5%	1	0.5%	57	27.4%
	回答施設合計	41		131		15		21		208	

1-115. 問1-114で「(1)、病名」を必須と回答された方へ、それが不適切だった場合(例:赤血球製剤の病名が貧血等)、後で適切な病名に訂正していますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	訂正している	1	2.4%	10	24.4%	1	2.4%	1	2.4%	13	31.7%
2	訂正していない	2	4.9%	19	46.3%	3	7.3%	4	9.8%	28	68.3%
	回答施設合計	3		29		4		5		41	

1-116. 問1-114で「(2) 輸血目的(理由)」を必須と回答された方へ、その妥当性を検証していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	検証している	9	9.2%	15	15.3%	3	3.1%	6	6.1%	33	33.7%
2	検証していない	7	7.1%	44	44.9%	7	7.1%	7	7.1%	65	66.3%
	回答施設合計	16		59		10		13		98	

1-117. 輸血オーダー時に、不適正なオーダーへのアラート表示がありますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	4	2.9%	0	0.0%	1	0.7%	5	3.6%
2	一部あり	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.7%	2	1.5%
3	ない	23	16.8%	81	59.1%	13	9.5%	13	9.5%	130	94.9%
	回答施設合計	23		86		13		15		137	

1-118. 厚労省の「血液製剤の使用指針」はどこで参照できますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	オーダー端末	0	0.0%	3	2.1%	5	3.4%	4	2.7%	12	8.2%
2	他のコンピュータ端末	11	7.5%	18	12.3%	0	0.0%	1	0.7%	30	20.5%
3	医局	2	1.4%	8	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	10	6.8%
4	輸血部門	5	3.4%	31	21.2%	7	4.8%	6	4.1%	49	33.6%
5	その他	6	4.1%	36	24.7%	0	0.0%	3	2.1%	45	30.8%
	回答施設合計	24		96		12		14		146	

1-119. 特に不適正なオーダーが目立つ診療科あるいは医師が存在しますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	存在する	0	0.0%	7	5.0%	2	1.4%	6	4.3%	15	10.6%
2	存在しない	22	15.6%	88	62.4%	9	6.4%	7	5.0%	126	89.4%
	回答施設合計	22		95		11		13		141	

1-120. 院内の輸血監査を実施していますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施している	2	1.3%	16	10.5%	2	1.3%	5	3.3%	25	16.3%
2	実施していない	28	18.3%	81	52.9%	10	6.5%	9	5.9%	128	83.7%
	回答施設合計	30		97		12		14		153	

1-121. 問1-120で(1)実施している、と回答された方へ、監査に適正使用の内容も含まれていますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	含まれている	0	0.0%	13	52.0%	1	4.0%	4	16.0%	18	72.0%
2	含まれていない	2	8.0%	3	12.0%	1	4.0%	1	4.0%	7	28.0%
	回答施設合計	2		16		2		5		25	

1-122. 貴院での輸血のチーム医療は適正使用に役立っていますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	役立っている	13	10.5%	49	39.5%	5	4.0%	9	7.3%	76	61.3%
2	役立っていない	7	5.6%	32	25.8%	5	4.0%	4	3.2%	48	38.7%
	回答施設合計	20		81		10		13		124	

1-123. 問1-122で「(1)役立っている」と回答された方へ、熱心に取り組んでいる職種を挙げて下さい。

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	医師	11	5.8%	23	12.2%	5	2.6%	9	4.8%	48	25.4%
2	看護師	10	5.3%	29	15.3%	4	2.1%	8	4.2%	51	27.0%
3	検査技師	4	2.1%	39	20.6%	5	2.6%	8	4.2%	56	29.6%
4	薬剤師	3	1.6%	12	6.3%	4	2.1%	6	3.2%	25	13.2%
5	日赤職員	0	0.0%	3	1.6%	1	0.5%	2	1.1%	6	3.2%
6	その他	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	2	1.1%	3	1.6%
	回答施設合計	28		106		20		35		189	

1-124. 輸血療法委員会で適正使用について検討していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	検討している	3	2.2%	37	27.4%	11	8.1%	14	10.4%	65	48.1%
2	検討していない	18	13.3%	51	37.8%	1	0.7%	0	0.0%	70	51.9%
	回答施設合計	21		88		12		14		135	

1-125. 問1-124で「(1)検討している」と回答された方へ、検討内容をご教示下さい

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	各科別使用量	1	0.8%	25	19.8%	6	4.8%	14	11.1%	46	36.5%
2	各科別査定率	0	0.0%	1	0.8%	1	0.8%	2	1.6%	4	3.2%
3	過剰オーダー	0	0.0%	20	15.9%	3	2.4%	10	7.9%	33	26.2%
4	症例検討	0	0.0%	5	4.0%	3	2.4%	6	4.8%	14	11.1%
5	T&S	0	0.0%	5	4.0%	6	4.8%	4	3.2%	15	11.9%
6	MSBOS	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	0.8%
7	適正使用の目安となる検査値の設定	2	1.6%	6	4.8%	0	0.0%	2	1.6%	10	7.9%
8	その他	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	3	2.4%
	回答施設合計	3		62		22		39		126	

1-126. 輸血療法委員会の他に、適正使用を推進する機会がありますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	5	3.4%	0	0.0%	3	2.1%	8	5.5%
2	ない	28	19.2%	88	60.3%	12	8.2%	10	6.8%	138	94.5%
	回答施設合計	28		93		12		13		146	

1-127. 貴院では医師の赴任時に、適正使用について説明する機会があればご教示下さい。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	年1回実施	0	0.0%	2	1.5%	3	2.3%	4	3.1%	9	6.9%
2	年2回実施	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	3	2.3%	4	3.1%
3	年4回実施	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	年6回実施	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
5	毎月実施	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
6	実施していない	19	14.6%	80	61.5%	8	6.2%	6	4.6%	113	86.9%
7	その他	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.8%	2	1.5%
	回答施設合計	19		86		11		14		130	

1-128. 血液製剤について、使用基準を遵守していると判断された場合でも、保険査定を受けたことがありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	1	0.7%	3	2.1%	2	1.4%	2	1.4%	8	5.7%
2	ない	23	16.4%	90	64.3%	10	7.1%	9	6.4%	132	94.3%
	回答施設合計	24		93		12		11		140	

1-129. 問1-128で「(1)ある」と回答された方へ、その製剤はどれですか。

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	赤血球製剤	1	5.3%	1	5.3%	1	5.3%	1	5.3%	4	21.1%
2	血小板製剤	0	0.0%	1	5.3%	2	10.5%	2	10.5%	5	26.3%
3	血漿製剤	0	0.0%	3	15.8%	1	5.3%	1	5.3%	5	26.3%
4	アルブミン製剤	0	0.0%	2	10.5%	1	5.3%	2	10.5%	5	26.3%
	回答施設合計	1		7		5		6		19	

1-130. 各血液製剤の査定率を把握されていたら、ご教示下さい。

各血液製剤の査定率(%)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	(1)赤血球製剤	2	43	99	71.0	142	39.6
	(2)血小板製剤	0	－	－	－	－	－
	(3)血漿製剤	0	－	－	－	－	－
	(4)アルブミン製剤	1	1	1	1.0	1	－
1～299床	(1)赤血球製剤	1	5	5	5.0	5	－
	(2)血小板製剤	0	－	－	－	－	－
	(3)血漿製剤	2	5	5	5.0	10	0.0
	(4)アルブミン製剤	1	1	1	1.0	1	－
300～499床	(1)赤血球製剤	0	－	－	－	－	－
	(2)血小板製剤	0	－	－	－	－	－
	(3)血漿製剤	0	－	－	－	－	－
	(4)アルブミン製剤	0	－	－	－	－	－
500床以上	(1)赤血球製剤	0	－	－	－	－	－
	(2)血小板製剤	1	1	1	1.0	1	－
	(3)血漿製剤	1	1	1	1.0	1	－
	(4)アルブミン製剤	1	3	3	3.0	3	－
全体	(1)赤血球製剤	3	5	99	49.0	147	47.3
	(2)血小板製剤	1	1	1	1.0	1	－
	(3)血漿製剤	3	1	5	3.7	11	2.3
	(4)アルブミン製剤	3	1	3	1.7	5	1.2

2-6) 業務手順書の整備状況について

1-131. 輸血療法に関する院内マニュアルはありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	作成している	24	13.8%	93	53.4%	14	8.0%	15	8.6%	146	83.9%
2	作成する予定である	1	0.6%	5	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	6	3.4%
3	作成していない	6	3.4%	13	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	19	10.9%
4	使用実績がない	1	0.6%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.7%
	回答施設合計	32		113		14		15		174	

1-132. 宗教的輸血拒否に関するマニュアルはありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	作成している	4	2.3%	26	15.1%	12	7.0%	14	8.1%	56	32.6%
2	作成する予定である	2	1.2%	6	3.5%	1	0.6%	0	0.0%	9	5.2%
3	作成していない	18	10.5%	61	35.5%	1	0.6%	1	0.6%	81	47.1%
4	使用実績がない	9	5.2%	17	9.9%	0	0.0%	0	0.0%	26	15.1%
	回答施設合計	33		110		14		15		172	

1-133. 自己血輸血に関するマニュアルはありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	作成している	1	0.6%	36	20.7%	14	8.0%	14	8.0%	65	37.4%
2	作成する予定である	0	0.0%	5	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.9%
3	作成していない	12	6.9%	30	17.2%	0	0.0%	0	0.0%	42	24.1%
4	使用実績がない	20	11.5%	41	23.6%	0	0.0%	1	0.6%	62	35.6%
	回答施設合計	33		112		14		15		174	

2-7) 業務手順書の実施のための処置の状況について

1-134. 血液製剤の使用について業務手順書の実施を浸透させるために行った病院としての取り組みは

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血療法委員会等で検討し、病院全体で取り組んでいる。	4	2.5%	41	25.2%	14	8.6%	15	9.2%	74	45.4%
2	病院全体での取組はなく、担当部署にまかされている。	21	12.9%	57	35.0%	0	0.0%	0	0.0%	78	47.9%
3	わからない。	3	1.8%	8	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	11	6.7%
	回答施設合計	28		106		14		15		163	

1-135. 血液製剤の使用について業務手順書の実施を浸透させるために行った具体的な取り組みは

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	マニュアルの配布	16	5.4%	87	29.1%	12	4.0%	12	4.0%	127	42.5%
2	輸血前・後の評価システム導入	1	0.3%	5	1.7%	1	0.3%	2	0.7%	9	3.0%
3	アンケート実施	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.7%	4	1.3%
4	手順書の改定	8	2.7%	47	15.7%	7	2.3%	13	4.3%	75	25.1%
5	輸血療法委員会で手順書について話し合った	4	1.3%	32	10.7%	7	2.3%	12	4.0%	55	18.4%
6	輸血療法委員会の回数増加	0	0.0%	4	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.3%
7	専任の輸血責任医師の任命	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%	2	0.7%	4	1.3%
8	専任の輸血担当技師の任命	0	0.0%	1	0.3%	2	0.7%	5	1.7%	8	2.7%
9	その他	2	0.7%	7	2.3%	1	0.3%	3	1.0%	13	4.3%
	回答施設合計	31		186		31		51		299	1

2-8) その他輸血療法の安全管理について

1-136.「輸血療法の実施に関する指針」が2020年3月に改定されたことを知っていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	知っている	20	11.7%	91	53.2%	14	8.2%	15	8.8%	140	81.9%
2	知らない	11	6.4%	20	11.7%	0	0.0%	0	0.0%	31	18.1%
3	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	31		111		14		15		171	

1-137.「輸血療法の実施に関する指針」(改定版)を院内に周知していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	している	7	4.1%	62	36.3%	11	6.4%	12	7.0%	92	53.8%
2	してない	23	13.5%	39	22.8%	1	0.6%	3	1.8%	66	38.6%
3	わからない	3	1.8%	9	5.3%	1	0.6%	0	0.0%	13	7.6%
	回答施設合計	33		110		13		15		171	

1-138. 不適合輸血(過誤輸血)を防ぐための対策について

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液型検査検体と交差適合試験用検体は別の時点で採血した検体を用いることを徹底する	19	2.0%	69	7.4%	13	1.4%	15	1.6%	116	12.5%
2	血液型検査用検体は一患者分のみの採血管を用意し採血する	15	1.6%	53	5.7%	4	0.4%	9	1.0%	81	8.7%
3	輸血担当検査技師を配置する	1	0.1%	11	1.2%	11	1.2%	12	1.3%	35	3.8%
4	検査技師による輸血検査の24時間実施体制	2	0.2%	37	4.0%	14	1.5%	14	1.5%	67	7.2%
5	自動輸血検査機器の導入	1	0.1%	2	0.2%	13	1.4%	14	1.5%	30	3.2%
6	血液型検査において同一患者の二重チェック、同一検体の二重チェックの徹底	8	0.9%	49	5.3%	7	0.8%	13	1.4%	77	8.3%
7	輸血の準備および実施は、原則として1回一患者ごとを行う	18	1.9%	65	7.0%	13	1.4%	12	1.3%	108	11.6%
8	輸血担当検査技師による当直技師への輸血教育の実施	0	0.0%	10	1.1%	12	1.3%	13	1.4%	35	3.8%
9	血液型記入時の2名の医療従事者によるダブルチェックその他	12	1.3%	68	7.3%	4	0.4%	6	0.6%	90	9.7%
10	電子機器による確認・照合	1	0.1%	15	1.6%	12	1.3%	14	1.5%	42	4.5%
11	輸血前に患者自身に名前、生年月日、血液型などを名乗ってもらう	10	1.1%	44	4.7%	8	0.9%	10	1.1%	72	7.7%
12	輸血責任医師を任命する	4	0.4%	11	1.2%	6	0.6%	10	1.1%	31	3.3%
13	輸血療法委員会等で不適合輸血予防策を検討し、マニュアルを作成し実施する	2	0.2%	20	2.1%	7	0.8%	11	1.2%	40	4.3%
14	看護手順等に不適合輸血予防策について記載して実施している	3	0.3%	20	2.1%	6	0.6%	9	1.0%	38	4.1%
15	輸血医療に専門性を有する医療従事者(医師、看護師、検査技師、薬剤師など)が巡視し指導・教育する	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.2%	4	0.4%
16	院内輸血講習会を行う	1	0.1%	19	2.0%	3	0.3%	7	0.8%	30	3.2%
17	院外講師を呼んで輸血講演を行う	3	0.3%	23	2.5%	5	0.5%	4	0.4%	35	3.8%
回答施設合計		101		517		138		175		931	

【3】 使用実態について

3-1) 輸血を実施した件数と実患者数について

1-139. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血を実施しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施した	32	18.5%	111	64.2%	14	8.1%	13	7.5%	170	98.3%
2	実施していない	1	0.6%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.7%
	回答施設合計	33		113		14		13		173	

1-140. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血を実施した件数について

輸血実施件数(件)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	(1)同種血のみ	32	1	274	28.5	912	51.7
	(2)自己血のみ	0	—	—	—	—	—
	(3)同種血、自己血併用	0	—	—	—	—	—
	(4)実施件数合計	32	1	274	28.5	912	51.7
1～299床	(1)同種血のみ	105	1	2,506	204.6	21,479	346.3
	(2)自己血のみ	26	1	146	36.4	947	47.9
	(3)同種血、自己血併用	6	1	8	3.2	19	2.9
	(4)実施件数合計	105	1	2,521	213.8	22,445	347.4
300～499床	(1)同種血のみ	9	483	9,050	2,488.6	22,397	2,641.2
	(2)自己血のみ	7	1	1,302	230.7	1,615	476.6
	(3)同種血、自己血併用	5	1	19	5.8	29	7.7
	(4)実施件数合計	9	489	9,050	2,671.2	24,041	2,596.5
500床以上	(1)同種血のみ	11	1,394	12,537	5,920.2	65,122	2,891.0
	(2)自己血のみ	11	13	592	143.8	1,582	178.4
	(3)同種血、自己血併用	6	1	7	3.7	22	2.5
	(4)実施件数合計	11	1,479	12,907	6,066.0	66,726	2,978.0
全体	(1)同種血のみ	157	1	12,537	700.1	109,910	1,827.0
	(2)自己血のみ	44	1	1,302	94.2	4,144	214.8
	(3)同種血、自己血併用	17	1	19	4.1	70	4.5
	(4)実施件数合計	157	1	12,907	726.9	114,124	1,871.0

1-141. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血を実施した実患者数について

輸血実施患者数(人)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	(1)同種血のみ	32	1	151	14.3	456	30.2
	(2)自己血のみ	0	—	—	—	—	—
	(3)同種血、自己血併用	0	—	—	—	—	—
	(4)実患者数合計	32	1	151	14.3	456	30.2
1～299床	(1)同種血のみ	102	1	768	85.8	8,753	127.6
	(2)自己血のみ	24	1	146	31.4	754	39.1
	(3)同種血、自己血併用	6	1	8	2.3	14	2.8
	(4)実患者数合計	102	1	768	93.3	9,521	132.0
300～499床	(1)同種血のみ	12	307	1,351	592.8	7,113	285.0
	(2)自己血のみ	10	1	593	91.7	917	181.7
	(3)同種血、自己血併用	7	1	15	4.1	29	5.1
	(4)実患者数合計	12	394	1,351	671.6	8,059	318.6
500床以上	(1)同種血のみ	12	405	1,837	1,156.4	13,877	483.2
	(2)自己血のみ	12	13	493	100.1	1,201	131.8
	(3)同種血、自己血併用	7	1	15	5.1	36	4.9
	(4)実患者数合計	12	450	2,020	1,259.5	15,114	535.5
全体	(1)同種血のみ	158	1	1,837	191.1	30,199	360.3
	(2)自己血のみ	46	1	593	62.4	2,872	112.7
	(3)同種血、自己血併用	20	1	15	4.0	79	4.4
	(4)実患者数合計	158	1	2,020	209.8	33,150	394.6

3-2) 輸血用血液製剤の使用実績について

1-142. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血用血液製剤(赤血球製剤、血小板製剤、新鮮凍結血漿)を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	34	19.7%	111	64.2%	14	8.1%	14	8.1%	173	100.0%
2	使用していない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	34		111		14		14		173	

3-3) 赤血球製剤の使用実績について

1-143. 2019年4月～2020年3月の期間で赤血球製剤を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	32	18.2%	114	64.8%	14	8.0%	15	8.5%	175	99.4%
2	使用していない	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	回答施設合計	32		115		14		15		176	

1-144. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した赤血球製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、 照射赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0床	18	1	62	12.7	228	15.9
	1～299床	80	1	672	37.8	3,022	90.8
	300～499床	12	2	1,044	230.4	2,765	374.1
	500床以上	14	1	1,130	184.4	2,582	340.2
	全体	124	1	1,130	69.3	8,597	187.7
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、 照射赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0床	25	2	237	34.2	856	58.0
	1～299床	106	1	2,442	239.7	25,404	348.3
	300～499床	14	545	4,290	1,747.5	24,465	949.8
	500床以上	14	1,188	9,026	4,444.6	62,224	2,271.0
	全体	159	1	9,026	710.4	112,949	1,460.0
(3) 洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR-1、 照射洗浄赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	3	4	30	14.3	43	13.8
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	3	4	30	14.3	43	13.8
(4) 洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR-2、 照射洗浄赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0床	3	2	35	18.3	55	16.5
	1～299床	5	1	201	43.0	215	88.3
	300～499床	2	1	50	25.5	51	34.6
	500床以上	5	3	24	14.0	70	8.6
	全体	15	1	201	26.1	391	50.4
(5) 解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR-1、 照射解凍赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1	1	1.0	1	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	1	1	1.0	1	—
(6) 解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR-2、 照射解凍赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	5	5	5.0	5	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	5	5	5.0	5	—
(7) 合成血液-LR-1、 照射合成血液-LR-1製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(8) 合成血液-LR-2、 照射合成血液-LR-2製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

【特別集計：赤血球製剤の使用総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤総袋(本)数	0床	31	2	274	36.7	1,139	59.0
	1～299床	111	1	2,506	258.5	28,690	363.9
	300～499床	14	547	4,293	1,948.6	27,281	1,043.2
	500床以上	14	1,200	9,383	4,634.0	64,876	2,480.1
	全体	170	1	9,383	717.6	121,986	1,504.4
赤血球製剤総単位数	0床	31	4	511	66.1	2,050	111.5
	1～299床	111	2	4,948	489.3	54,314	703.0
	300～499床	14	1,092	8,584	3,699.8	51,797	1,964.4
	500床以上	14	2,388	18,409	9,083.6	127,170	4,743.9
	全体	170	2	18,409	1,384.3	235,331	2,924.3

【特別集計：一般病床数あたりの赤血球製剤使用量】

一般病床数あたりの製剤別血液製剤使用量(単位) (計算式：製剤別血液製剤使用量÷一般病床数)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤／単位	1～299床	111	0.0	31.9	5.5	616.0	5.7
	300～499床	14	3.4	19.6	10.1	141.9	5.2
	500床以上	14	4.7	26.3	13.3	186.3	5.8
	全体	139	0.0	31.9	6.8	944.1	6.2

1-145. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した赤血球製剤の診療科別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください。

【(1) 人赤血球液製剤】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	3	58	743	374.0	1,122
		300～499床	5	15	1,223	602.2	3,011
		500床以上	9	92	3,069	801.0	7,209
		全体	17	15	3,069	667.2	11,342
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	3	112	1,458	736.7	2,210
		300～499床	6	30	2,139	1,015.2	6,091
		500床以上	9	184	6,067	1,578.1	14,203
		全体	18	30	6,067	1,250.2	22,504
(2) 消化器外科	袋(本)	0床	1	37	37	37.0	37
		1～299床	22	6	356	140.2	3,084
		300～499床	7	43	512	180.7	1,265
		500床以上	9	1	988	409.9	3,689
		全体	39	1	988	207.1	8,075
	単位	0床	1	72	72	72.0	72
		1～299床	23	2	712	264.3	6,080
		300～499床	8	86	884	345.0	2,760
		500床以上	9	2	1,976	817.6	7,358
		全体	41	2	1,976	396.8	16,270
(3) 脳神経外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	11	1	75	19.7	217
		300～499床	10	2	110	46.6	466
		500床以上	11	7	325	78.2	860
		全体	32	1	325	48.2	1,543
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	11	2	149	37.9	417
		300～499床	11	4	184	85.8	944
		500床以上	11	12	650	153.8	1,692
		全体	33	2	650	92.5	3,053

1-145. 【(1) 人赤血球液製剤】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	3	7	56	86	25.0
		500床以上	9	2	68	258	28.7
		全体	12	2	68	344	26.7
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	4	14	94	214	33.2
		500床以上	9	4	136	488	53.8
		全体	13	4	136	702	47.0
(5) 整形外科	袋(本)	0床	1	274	274	274.0	—
		1～299床	43	1	356	3,650	73.1
		300～499床	11	30	406	1,626	109.0
		500床以上	10	65	335	1,776	84.2
		全体	65	1	406	7,326	90.3
	単位	0床	1	511	511	511.0	—
		1～299床	44	2	696	7,119	143.9
		300～499床	12	60	802	3,356	193.8
		500床以上	10	130	670	3,561	171.1
		全体	67	2	802	14,547	175.3
(6) 産婦人科	袋(本)	0床	1	9	9	9	—
		1～299床	16	2	112	511	33.8
		300～499床	10	2	281	604	84.3
		500床以上	9	52	598	2,678	214.7
		全体	36	2	598	3,802	160.2
	単位	0床	1	9	9	9	—
		1～299床	17	4	224	1,068	64.9
		300～499床	11	4	546	1,214	158.0
		500床以上	9	104	1,193	5,231	429.5
		全体	38	4	1,193	7,522	309.5
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	6	3	117	188	44.1
		300～499床	4	4	130	154	61.1
		500床以上	10	2	96	255	31.3
		全体	20	2	130	597	39.9
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	6	6	233	373	87.7
		300～499床	5	6	230	284	97.1
		500床以上	10	4	192	491	60.1
		全体	21	4	233	1,148	74.0

1-145.【(1) 人赤血球液製剤】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(8) 泌尿器科	袋(本)	0床	1	2	2	2.0	2	－
		1～299床	9	4	98	62.2	560	39.1
		300～499床	10	40	200	83.1	831	51.4
		500床以上	11	80	333	168.1	1,849	85.8
		全体	31	2	333	104.6	3,242	78.6
	単位	0床	1	4	4	4.0	4	－
		1～299床	9	8	182	119.4	1,075	75.4
		300～499床	11	65	400	157.8	1,736	96.0
		500床以上	11	160	614	326.7	3,594	159.1
		全体	32	4	614	200.3	6,409	148.5
(9) その他の外科	袋(本)	0床	0	－	－	－	－	－
		1～299床	21	2	343	113.3	2,379	112.5
		300～499床	9	4	580	169.6	1,526	186.9
		500床以上	10	5	555	162.4	1,624	190.7
		全体	40	2	580	138.2	5,529	150.9
	単位	0床	0	－	－	－	－	－
		1～299床	21	4	670	219.0	4,598	219.3
		300～499床	10	8	1,156	365.6	3,656	368.0
		500床以上	10	10	999	312.7	3,127	355.8
		全体	41	4	1,156	277.6	11,381	295.0
(10) 血液内科	袋(本)	0床	2	20	198	109.0	218	125.9
		1～299床	9	11	450	137.6	1,238	145.7
		300～499床	6	22	897	368.2	2,209	309.4
		500床以上	7	859	2,024	1,378.9	9,652	537.8
		全体	24	11	2,024	554.9	13,317	636.8
	単位	0床	2	40	396	218.0	436	251.7
		1～299床	9	21	900	271.9	2,447	292.8
		300～499床	7	44	4,780	1,279.6	8,957	1,622.5
		500床以上	7	1,676	4,048	2,711.6	18,981	1,046.2
		全体	25	21	4,780	1,232.8	30,821	1,426.0

1-145. 【(1) 人赤血球液製剤】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) 循環器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	16	2	641	88.7	1,419	167.6
		300～499床	12	10	431	151.4	1,817	141.1
		500床以上	10	29	820	250.6	2,506	247.5
		全体	38	2	820	151.1	5,742	191.3
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	17	4	1,258	169.6	2,883	319.2
		300～499床	12	20	862	287.7	3,452	265.2
		500床以上	10	148	1,630	547.5	5,475	467.0
		全体	39	4	1,630	302.8	11,810	372.4
(12) 消化器内科	袋(本)	0床	2	4	25	14.5	29	14.8
		1～299床	16	5	190	51.9	830	52.6
		300～499床	11	15	460	274.8	3,023	132.7
		500床以上	10	190	741	413.9	4,139	199.4
		全体	39	4	741	205.7	8,021	199.6
	単位	0床	2	8	45	26.5	53	26.2
		1～299床	16	6	372	97.4	1,558	102.5
		300～499床	11	30	915	508.5	5,594	267.5
		500床以上	10	376	1,473	815.7	8,157	387.3
		全体	39	6	1,473	393.9	15,362	391.5
(13) 呼吸器内科	袋(本)	0床	1	2	2	2.0	2	—
		1～299床	5	8	284	80.8	404	119.6
		300～499床	9	2	69	42.7	384	26.4
		500床以上	8	4	149	68.6	549	48.1
		全体	23	2	284	58.2	1,339	63.2
	単位	0床	1	4	4	4.0	4	—
		1～299床	5	16	530	153.8	769	223.3
		300～499床	9	4	138	84.0	756	52.1
		500床以上	8	8	298	135.3	1,082	95.6
		全体	23	4	530	113.5	2,611	120.0
(14) 腎臓内科	袋(本)	0床	7	4	32	12.9	90	10.2
		1～299床	14	6	744	104.0	1,456	190.0
		300～499床	8	16	185	97.9	783	58.6
		500床以上	6	46	296	153.8	923	101.6
		全体	35	4	744	92.9	3,252	134.4
	単位	0床	7	8	53	23.7	166	17.4
		1～299床	15	12	1,450	191.5	2,872	360.1
		300～499床	8	32	354	193.5	1,548	113.5
		500床以上	6	92	592	299.8	1,799	197.2
		全体	36	8	1,450	177.4	6,385	259.8

1-145. 【(1) 人赤血球液製剤】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(15) 神経内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	2	2	7	4.5	9	3.5
		300～499床	4	1	28	17.0	68	12.2
		500床以上	7	3	20	12.9	90	7.2
		全体	13	1	28	12.8	167	9.0
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	2	4	14	9.0	18	7.1
		300～499床	5	2	52	26.0	130	24.1
		500床以上	7	6	38	25.0	175	13.6
		全体	14	2	52	23.1	323	17.4
(16) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	3	6	14	11.0	33	4.4
		500床以上	2	13	32	22.5	45	13.4
		全体	5	6	32	15.6	78	9.7
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	3	12	28	21.3	64	8.3
		500床以上	2	26	64	45.0	90	26.9
		全体	5	12	64	30.8	154	19.6
(17) 内分泌代謝科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	4	4	4.0	4	—
		300～499床	5	4	34	14.8	74	11.9
		500床以上	2	1	72	36.5	73	50.2
		全体	8	1	72	18.9	151	23.9
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	8	8	8.0	8	—
		300～499床	5	8	68	28.8	144	24.6
		500床以上	2	2	144	73.0	146	100.4
		全体	8	2	144	37.3	298	48.2

1-145.【(1) 人赤血球液製剤】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(18) その他の内科	袋(本)	0床	8	3	65	21.4	171	25.6
		1～299床	46	8	567	117.4	5,399	129.6
		300～499床	11	7	298	97.9	1,077	92.1
		500床以上	10	5	644	177.8	1,778	202.1
		全体	75	3	644	112.3	8,425	133.8
	単位	0床	8	6	112	36.6	293	43.3
		1～299床	48	4	1,134	218.5	10,487	254.4
		300～499床	11	12	582	190.5	2,095	182.5
		500床以上	10	10	1,284	356.3	3,563	404.5
		全体	77	4	1,284	213.5	16,438	264.6
(19) 精神科・心療内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	2	3	5	4.0	8	1.4
		全体	2	3	5	4.0	8	1.4
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	2	6	10	8.0	16	2.8
		全体	2	6	10	8.0	16	2.8
(20) 小児科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	2	7	4.5	9	3.5
		500床以上	6	12	801	176.5	1,059	310.4
		全体	8	2	801	133.5	1,068	274.2
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	3	14	8.5	17	7.8
		500床以上	6	14	1,405	297.5	1,785	549.4
		全体	8	3	1,405	225.3	1,802	483.2
(21) 腫瘍治療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	151	151	151.0	151	—
		300～499床	2	9	18	13.5	27	6.4
		500床以上	2	68	274	171.0	342	145.7
		全体	5	9	274	104.0	520	110.5
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	302	302	302.0	302	—
		300～499床	2	18	32	25.0	50	9.9
		500床以上	2	125	548	336.5	673	299.1
		全体	5	18	548	205.0	1,025	222.7

1-145.【(1) 人赤血球液製剤】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 救急科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	2	30	16.0	19.8
		300～499床	6	7	698	185.3	255.9
		500床以上	10	24	1,629	637.2	592.3
		全体	18	2	1,629	417.6	7,516
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	4	58	31.0	62
		300～499床	7	14	1,218	420.6	2,944
		500床以上	10	48	3,258	1,263.0	1,177.1
		全体	19	4	3,258	822.9	15,636
(23) 歯科・口腔外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	4	4	4.0	4
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	3	2	10	5.3	16
		全体	4	2	10	5.0	20
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	8	8	8.0	8
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	3	4	20	10.7	32
		全体	4	4	20	10.0	40
(24) その他の診療科	袋(本)	0床	2	7	16	11.5	23
		1～299床	10	2	180	39.4	394
		300～499床	5	2	81	21.8	109
		500床以上	10	3	402	116.4	1,164
		全体	27	2	402	62.6	1,690
	単位	0床	2	12	32	22.0	44
		1～299床	10	4	360	76.7	767
		300～499床	6	4	144	51.3	308
		500床以上	10	6	1,020	317.1	3,171
		全体	28	4	1,020	153.2	4,290

1-145.

【(2) 洗浄人赤血球液】

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(2) 消化器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	2	14	231	122.5	245	153.4
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	2	14	231	122.5	245	153.4
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	2	8	432	220.0	440	299.8
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	2	8	432	220.0	440	299.8
(3) 脳神経外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	1	1	1.0	1	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	1	1	1.0	1	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	2	2	2.0	2	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	2	2	2.0	2	—
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-145.【(2) 洗浄人赤血球液】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 整形外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	4	4	4.0	4	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	4	4	4.0	4	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	8	8	8.0	8	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
全体		1	8	8	8.0	8	—	
(6) 産婦人科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
全体		0	—	—	—	—	—	
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
全体		0	—	—	—	—	—	
(8) 泌尿器科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	1	8	8	8.0	8	—
		全体	1	8	8	8.0	8	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	2	2	2.0	2	—
		500床以上	1	16	16	16.0	16	—
全体		2	2	16	9.0	18	9.9	

1-145.【(2) 洗浄人赤血球液】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) その他の外科	袋(本)	0床	1	18	18	18.0	18	—
		1～299床	1	2	2	2.0	2	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	2	2	18	10.0	20	11.3
	単位	0床	1	36	36	36.0	36	—
		1～299床	1	4	4	4.0	4	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	2	4	36	20.0	40	22.6
(10) 血液内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	49	49	49.0	49	—
		500床以上	3	3	24	15.7	47	11.2
		全体	4	3	49	24.0	96	19.0
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	98	98	98.0	98	—
		500床以上	3	6	48	31.3	94	22.3
		全体	4	6	98	48.0	192	38.0
(11) 循環器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(12) 消化器内科	袋(本)	0床	1	2	2	2.0	2	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	2	2	2.0	2	—
	単位	0床	1	4	4	4.0	4	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	4	4	4.0	4	—

1-145.【(2) 洗浄人赤血球液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(14) 腎臓内科	袋(本)	0床	1	35	35	35.0	35
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	35	35	35.0	35
	単位	0床	1	70	70	70.0	70
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	70	70	70.0	70
(15) 神経内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(16) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(2) 洗浄人赤血球液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) 内分泌代謝科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(18) その他の内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	3	13	8.0	16
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	2	3	13	8.0	16
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	6	19	12.5	25
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	2	6	19	12.5	25
(19) 精神科・心療内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(20) 小児科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(2) 洗浄人赤血球液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(21) 腫瘍治療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(22) 救急科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(23) 歯科・口腔外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(2) 洗浄人赤血球液】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(24) その他の診療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-145.

【(3) 解凍人赤血球液】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(2) 消化器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(3) 脳神経外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(3) 解凍人赤血球液】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 整形外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(6) 産婦人科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	6	6	6.0	6	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	6	6	6.0	6	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	11	11	11.0	11	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	11	11	11.0	11	—
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-145.【(3) 解凍人赤血球液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(8) 泌尿器科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(9) その他の外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(10) 血液内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(3) 解凍人赤血球液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) 循環器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(12) 消化器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(13) 呼吸器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(3) 解凍人赤血球液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(14) 腎臓内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(15) 神経内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(16) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(3) 解凍人赤血球液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) 内分泌代謝科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(18) その他の内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(19) 精神科・心療内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(3) 解凍人赤血球液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(20) 小児科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(21) 腫瘍治療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(22) 救急科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(3) 解凍人赤血球液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(23) 歯科・口腔外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(24) その他の診療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(4) 合成血液】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(2) 消化器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(3) 脳神経外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145. 【(4) 合成血液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(5) 整形外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(6) 産婦人科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(4) 合成血液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(8) 泌尿器科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(9) その他の外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145. 【(4) 合成血液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) 血液内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(11) 循環器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(12) 消化器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145. 【(4) 合成血液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(14) 腎臓内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(15) 神経内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(4) 合成血液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(17) 内分泌代謝科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(18) その他の内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(4) 合成血液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(20) 小児科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(21) 腫瘍治療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-145.【(4) 合成血液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 救急科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(23) 歯科・口腔外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(24) その他の診療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-146. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した赤血球製剤の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください。

【(1) 人赤血球液製剤】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0床	6	65	31.5	189	26.5
		1～299床	78	1,309	182.7	14,252	236.2
		300～499床	8	401	821.3	6,570	359.7
		500床以上	10	922	2,385.0	23,850	1,356.7
		全体	102	1	4,700	44,861	814.0
	単位	0床	6	112	55.8	335	44.7
		1～299床	78	2	3,699	28,893	538.9
		300～499床	8	802	1,497.9	11,983	580.9
		500床以上	10	1,832	4,652.0	46,520	2,529.9
		全体	102	2	8,570	87,731	1,579.5
(2) 外来	袋(本)	0床	8	69	22.1	177	21.1
		1～299床	34	500	65.9	2,239	109.8
		300～499床	8	533	262.6	2,101	180.3
		500床以上	10	1,453	723.6	7,236	481.3
		全体	60	1,453	195.9	11,753	328.1
	単位	0床	8	124	40.8	326	37.0
		1～299床	34	1,000	130.3	4,431	219.8
		300～499床	8	1,014	510.4	4,083	341.3
		500床以上	10	2,906	1,433.0	14,330	950.2
		全体	60	2	2,906	23,170	648.4
(3) 救急外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	8	99	33.3	266	32.4
		500床以上	8	620	217.9	1,743	194.7
		全体	16	2	620	2,009	165.1
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	8	4	65.9	527	65.3
		500床以上	8	20	432.5	3,460	390.3
		全体	16	4	1,240	3,987	330.1

1-146. 【(1) 人赤血球液製剤】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 手術室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	17	1	250	40.3	685
		300～499床	8	26	1,129	269.4	2,155
		500床以上	10	4	4,094	1,056.0	10,560
		全体	35	1	4,094	382.9	13,400
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	17	2	500	79.5	1,352
		300～499床	8	52	2,258	535.9	4,287
		500床以上	10	172	8,059	2,164.3	21,643
		全体	35	2	8,059	779.5	27,282
(5) 集中治療室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	185	185	185.0	185
		300～499床	5	186	921	510.8	2,554
		500床以上	7	136	2,188	844.4	5,911
		全体	13	136	2,188	665.4	8,650
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	350	350	350.0	350
		300～499床	5	332	1,841	999.2	4,996
		500床以上	7	233	4,278	1,646.7	11,527
		全体	13	233	4,278	1,297.9	16,873
(6) 医療機関外	袋(本)	0床	3	7	20	12.3	37
		1～299床	1	11	11	11.0	11
		300～499床	1	3	3	3.0	3
		500床以上	1	26	26	26.0	26
		全体	6	3	26	12.8	77
	単位	0床	3	14	40	24.7	74
		1～299床	1	17	17	17.0	17
		300～499床	1	6	6	6.0	6
		500床以上	1	52	52	52.0	52
		全体	6	6	52	24.8	149
(7) その他	袋(本)	0床	2	7	8	7.5	15
		1～299床	4	7	79	38.0	152
		300～499床	1	45	45	45.0	45
		500床以上	3	19	98	54.3	163
		全体	10	7	98	37.5	375
	単位	0床	2	8	12	10.0	20
		1～299床	4	14	158	75.5	302
		300～499床	1	90	90	90.0	90
		500床以上	3	38	196	108.0	324
		全体	10	8	196	73.6	736

1-146.

【(2) 洗淨人赤血球液】

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0床	1	18	18	18.0	18	－
		1～299床	4	4	81	28.0	112	35.6
		300～499床	1	4	4	4.0	4	－
		500床以上	2	3	24	13.5	27	14.8
		全体	8	3	81	20.1	161	25.7
	単位	0床	1	36	36	36.0	36	－
		1～299床	4	8	154	47.3	189	71.4
		300～499床	1	8	8	8.0	8	－
		500床以上	2	6	48	27.0	54	29.7
		全体	8	6	154	35.9	287	50.2
(2) 外来	袋(本)	0床	1	35	35	35.0	35	－
		1～299床	2	1	23	12.0	24	15.6
		300～499床	1	46	46	46.0	46	－
		500床以上	1	20	20	20.0	20	－
		全体	5	1	46	25.0	125	16.9
	単位	0床	1	70	70	70.0	70	－
		1～299床	2	2	46	24.0	48	31.1
		300～499床	1	92	92	92.0	92	－
		500床以上	1	40	40	40.0	40	－
		全体	5	2	92	50.0	250	33.9
(3) 救急外来	袋(本)	0床	0	－	－	－	－	－
		1～299床	0	－	－	－	－	－
		300～499床	0	－	－	－	－	－
		500床以上	0	－	－	－	－	－
		全体	0	－	－	－	－	－
	単位	0床	0	－	－	－	－	－
		1～299床	0	－	－	－	－	－
		300～499床	0	－	－	－	－	－
		500床以上	0	－	－	－	－	－
		全体	0	－	－	－	－	－

1-146.【(2) 洗浄人赤血球液】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 手術室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	1	8	8	8	—
		全体	1	8	8	8	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	1	16	16	16	—
		全体	1	16	16	16	—
(5) 集中治療室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(6) 医療機関外	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(7) その他	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-146.

【(3) 解凍人赤血球液】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0床	274	274	274.0	274	—
		1～299床	6	76	41.0	82	49.5
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	6	274	118.7	356	139.0
	単位	0床	511	511	511.0	511	—
		1～299床	11	150	80.5	161	98.3
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	11	511	224.0	672	258.1
(2) 外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(3) 救急外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-146.【(3) 解凍人赤血球液】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 手術室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(5) 集中治療室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(6) 医療機関外	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(7) その他	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-146.
【(4) 合成血液】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(2) 外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(3) 救急外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-146.【(4) 合成血液】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 手術室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(5) 集中治療室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(6) 医療機関外	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-146. 【(4) 合成血液】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) その他	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

3-4) 血小板製剤の使用実績について

1-147. 2019年4月～2020年3月の期間で血小板製剤を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	6	3.5%	60	35.3%	14	8.2%	15	8.8%	95	55.9%
2	使用していない	25	14.7%	50	29.4%	0	0.0%	0	0.0%	75	44.1%
	回答施設合計	31		110		14		15		170	

1-148. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した血小板製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1製剤)／袋(本)	0床	2	1	8	4.5	9	4.9
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	2	1	8	4.5	9	4.9
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	4	5	30	16.3	65	11.1
	300～499床	9	10	85	30.6	275	30.3
	500床以上	11	10	260	69.5	765	75.8
	全体	24	5	260	46.0	1,105	57.8
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10製剤)／袋(本)	0床	4	10	130	50.0	200	56.6
	1～299床	58	10	4,020	394.7	22,890	688.0
	300～499床	14	300	26,270	5,436.4	76,110	7,451.9
	500床以上	14	480	28,470	12,247.9	171,470	8,467.4
	全体	90	10	28,470	3,007.4	270,670	6,171.6
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	15	15	315	68.0	1,020	89.4
	300～499床	13	30	2,130	371.5	4,830	583.3
	500床以上	13	75	12,270	1,458.5	18,960	3,335.1
	全体	41	15	12,270	605.1	24,810	1,950.5
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	21	20	520	147.6	3,100	165.8
	300～499床	12	40	1,500	478.3	5,740	507.4
	500床以上	14	40	2,360	557.1	7,800	595.4
	全体	47	20	2,360	354.0	16,640	458.0

1-148. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-LR-10、照射濃厚血小板HLA-LR-10製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	3	170	260	213.3	640	45.1
	500床以上	7	20	730	290.0	2,030	279.3
	全体	10	20	730	267.0	2,670	232.0
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-LR-15、照射濃厚血小板HLA-LR-15製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	3	15	15	15.0	45	0.0
	500床以上	5	15	45	30.0	150	15.0
	全体	8	15	45	24.4	195	13.7
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-LR-20、照射濃厚血小板HLA-LR-20製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	2	40	120	80.0	160	56.6
	全体	2	40	120	80.0	160	56.6
(10) 人血小板濃厚液 (照射洗浄血小板-LR-10製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	2	280	800	540.0	1,080	367.7
	300～499床	3	10	1,900	820.0	2,460	973.5
	500床以上	6	20	1,170	611.7	3,670	462.0
	全体	11	10	1,900	655.5	7,210	567.2
(11) 人血小板濃厚液 (照射洗浄血小板-HLA-LR-10製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	3	10	300	180.0	540	151.3
	全体	3	10	300	180.0	540	151.3

【特別集計：血小板製剤の使用総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤総袋(本)数	0床	6	1	13	4.8	29	4.9
	1～299床	59	1	447	44.6	2,633	75.6
	300～499床	14	32	2,850	613.4	8,588	803.6
	500床以上	14	52	3,020	1,399.7	19,596	943.0
	全体	93	1	3,020	331.7	30,846	682.6
血小板製剤総単位数	0床	6	1	130	34.8	209	49.8
	1～299床	59	10	4,725	477.2	28,155	799.6
	300～499床	14	330	28,830	6,435.7	90,100	8,158.0
	500床以上	14	530	31,575	14,681.8	205,545	9,970.4
	全体	93	1	31,575	3,484.0	324,009	7,129.9

【特別集計：一般病床数あたりの血小板製剤使用量】

一般病床数あたりの血小板製剤使用量(単位) (計算式：血小板製剤使用量÷一般病床数)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤／単位	1～299床	59	0.1	48.7	5.2	308.4	10.0
	300～499床	14	1.0	64.9	17.6	245.8	21.0
	500床以上	14	1.1	45.1	21.3	298.8	13.8
	全体	87	0.1	64.9	9.8	853.1	14.4

1-149. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した血小板製剤の診療科別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください。

【(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板製剤)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	104	131	117.5	235
		300～499床	5	7	468	216.2	1,081
		500床以上	9	15	900	194.8	1,753
		全体	16	7	900	191.8	3,069
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	1,380	1,810	1,595.0	3,190
		300～499床	6	70	5,365	2,107.5	12,645
		500床以上	9	160	9,725	2,117.8	19,060
		全体	17	70	9,725	2,052.6	34,895
(2) 消化器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	11	1	38	10.9	120
		300～499床	6	2	64	19.0	114
		500床以上	9	4	37	20.7	186
		全体	26	1	64	16.2	420
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	11	10	400	117.7	1,295
		300～499床	7	10	720	182.1	1,275
		500床以上	9	40	420	220.0	1,980
		全体	27	10	720	168.5	4,550
(3) 脳神経外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	4	2	19	9.0	36
		300～499床	9	1	27	6.4	58
		500床以上	9	1	20	8.0	72
		全体	22	1	27	7.5	166
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	4	20	205	108.8	435
		300～499床	10	10	290	73.5	735
		500床以上	9	10	200	81.1	730
		全体	23	10	290	82.6	1,900

1-149.【(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	9	9	9.0	9	—
		500床以上	3	1	41	18.0	54	20.7
		全体	4	1	41	15.8	63	17.5
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	115	115	115.0	115	—
		500床以上	3	10	420	186.7	560	210.8
		全体	4	10	420	168.8	675	175.8
(5) 整形外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	12	1	14	3.9	47	3.6
		300～499床	7	1	21	6.7	47	8.0
		500床以上	8	1	16	6.6	53	4.9
		全体	27	1	21	5.4	147	5.4
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	12	10	140	44.6	535	34.9
		300～499床	8	10	210	66.9	535	71.1
		500床以上	8	10	160	70.0	560	50.9
		全体	28	10	210	58.2	1,630	51.2
(6) 産婦人科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	1	1	1.0	1	—
		300～499床	5	1	11	5.2	26	4.4
		500床以上	7	5	43	22.1	155	13.8
		全体	13	1	43	14.0	182	13.6
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	10	10	10.0	10	—
		300～499床	5	15	110	55.0	275	40.3
		500床以上	7	50	445	229.3	1,605	140.9
		全体	13	10	445	145.4	1,890	139.7
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	1	1	1.0	1	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	3	1	8	4.0	12	3.6
		全体	4	1	8	3.3	13	3.3
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	10	10	10.0	10	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	3	10	85	41.7	125	38.8
		全体	4	10	85	33.8	135	35.4

1-149. 【(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板製剤)】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(8) 泌尿器科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	6	2	14	5.5	4.9
		300～499床	8	1	17	7.5	6.1
		500床以上	11	1	31	11.2	9.7
		全体	25	1	31	8.6	7.8
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	6	20	145	59.2	49.6
		300～499床	9	10	180	77.8	61.8
		500床以上	11	10	330	120.0	103.5
		全体	26	10	330	91.3	81.7
(9) その他の外科	袋(本)	0床	1	5	5	5.0	—
		1～299床	7	1	22	7.9	7.8
		300～499床	8	5	125	32.1	44.7
		500床以上	8	2	53	21.0	19.3
		全体	24	1	125	20.2	29.1
	単位	0床	1	50	50	50.0	—
		1～299床	7	10	260	86.4	93.7
		300～499床	9	50	1,370	336.7	453.4
		500床以上	8	20	585	222.5	212.0
		全体	25	10	1,370	218.6	308.8
(10) 血液内科	袋(本)	0床	1	13	13	13.0	—
		1～299床	9	1	247	76.8	95.6
		300～499床	6	6	444	170.3	160.6
		500床以上	7	317	1,965	1,094.1	511.8
		全体	23	1	1,965	408.0	545.7
	単位	0床	1	130	130	130.0	—
		1～299床	9	10	2,470	584.4	870.2
		300～499床	7	60	25,110	5,192.9	8,916.8
		500床以上	7	3,185	23,745	11,570.7	6,350.4
		全体	24	10	25,110	5,114.0	7,302.3
(11) 循環器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	7	1	14	4.4	5.1
		300～499床	6	1	61	19.3	22.7
		500床以上	10	1	158	25.6	48.2
		全体	23	1	158	17.5	34.1
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	7	10	140	49.3	54.0
		300～499床	7	10	635	223.6	219.5
		500床以上	10	10	1,695	271.0	517.8
		全体	24	10	1,695	192.5	357.0

1-149. 【(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板製剤)】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(12) 消化器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	4	1	38	16.3	17.6
		300～499床	8	7	41	15.9	12.6
		500床以上	9	6	57	22.1	19.3
		全体	21	1	57	18.6	16.2
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	4	10	385	166.3	179.1
		300～499床	8	70	425	166.3	128.6
		500床以上	9	70	570	226.1	195.6
		全体	21	10	570	191.9	163.8
(13) 呼吸器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	2	12	7.0	7.1
		300～499床	7	4	63	22.0	20.5
		500床以上	9	1	39	15.8	17.1
		全体	18	1	63	17.2	17.7
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	20	125	72.5	145
		300～499床	7	45	640	222.1	206.3
		500床以上	9	10	390	163.9	177.3
		全体	18	10	640	176.4	179.8
(14) 腎臓内科	袋(本)	0床	1	8	8	8.0	—
		1～299床	7	1	105	17.0	38.8
		300～499床	7	2	38	10.7	13.3
		500床以上	5	2	21	11.0	7.0
		全体	20	1	105	12.9	23.5
	単位	0床	1	80	80	80.0	—
		1～299床	7	10	1,220	196.4	451.5
		300～499床	7	20	385	107.9	134.7
		500床以上	5	20	210	115.0	69.5
		全体	20	10	1,220	139.3	270.2
(15) 神経内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	1	9	5.0	5.7
		500床以上	1	3	3	3.0	—
		全体	3	1	9	4.3	4.2
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	10	105	57.5	67.2
		500床以上	1	30	30	30.0	—
		全体	3	10	105	48.3	50.1

1-149. 【(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	3	12	7.5	15	6.4
		500床以上	2	1	16	8.5	17	10.6
		全体	4	1	16	8.0	32	7.2
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	30	130	80.0	160	70.7
		500床以上	2	15	165	90.0	180	106.1
		全体	4	15	165	85.0	340	73.8
(17) 内分泌代謝科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	1	2	1.5	3	0.7
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	2	1	2	1.5	3	0.7
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	10	25	17.5	35	10.6
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	2	10	25	17.5	35	10.6
(18) その他の内科	袋(本)	0床	2	1	1	1.0	2	0.0
		1～299床	18	3	133	30.8	555	37.5
		300～499床	8	2	98	23.0	184	31.8
		500床以上	8	1	307	53.0	424	104.8
		全体	36	1	307	32.4	1,165	57.1
	単位	0床	2	10	10	10.0	20	0.0
		1～299床	18	30	1,475	330.8	5,955	413.3
		300～499床	8	35	1,190	261.3	2,090	387.7
		500床以上	8	10	4,035	656.9	5,255	1,383.5
		全体	36	10	4,035	370.0	13,320	725.0
(19) 精神科・心療内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-149. 【(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板製剤)】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(20) 小児科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	1	1.0	2	0.0
		500床以上	4	1	583	704	272.8
		全体	6	1	583	706	229.8
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	5	10	15	3.5
		500床以上	4	10	5,975	6,975	2,830.1
		全体	6	5	5,975	6,990	2,368.4
(21) 腫瘍治療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	7	10	17	2.1
		500床以上	2	15	41	56	18.4
		全体	4	7	41	73	15.5
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	60	100	160	28.3
		500床以上	2	175	420	595	173.2
		全体	4	60	420	755	161.4
(22) 救急科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	3	4	56	71	28.2
		500床以上	8	2	256	769	89.6
		全体	11	2	256	840	83.2
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	4	40	570	930	233.3
		500床以上	8	20	2,705	8,205	957.3
		全体	12	20	2,705	9,135	866.3
(23) 歯科・口腔外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	30	30	30	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	30	30	30	—

1-149. 【(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板製剤)】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(24) その他の診療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	10	10.5	21	0.7
		300～499床	4	1	6.0	24	5.6
		500床以上	7	1	65	159	27.3
		全体	13	1	65	204	21.1
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	110	110.0	220	0.0
		300～499床	5	15	60.0	300	41.5
		500床以上	7	10	705	1,685	291.5
		全体	14	10	705	2,205	217.9

1-149.

【(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-製剤)】

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(2) 消化器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(3) 脳神経外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-149.【(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(5) 整形外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(6) 産婦人科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	22	22	22.0	22	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	22	22	22.0	22	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	225	225	225.0	225	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	225	225	225.0	225	—
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-149.【(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(8) 泌尿器科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(9) その他の外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(10) 血液内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	17	27	22.0	44	7.1
		500床以上	4	3	39	12.8	51	17.5
		全体	6	3	39	15.8	95	14.7
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	175	275	225.0	450	70.7
		500床以上	4	35	395	130.0	520	176.8
		全体	6	35	395	161.7	970	148.9
(11) 循環器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-149.【(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-製剤)】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(12) 消化器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	1	1	1	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	1	1.0	1	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	10	10	10	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	10	10.0	10	—
(13) 呼吸器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(14) 腎臓内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(15) 神経内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-149.【(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-製剤)】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(17) 内分泌代謝科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(18) その他の内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(19) 精神科・心療内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-149.【(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-製剤)】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(20) 小児科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(21) 腫瘍治療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	3	3	3.0	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	3	3	3.0	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	30	30	30.0	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	30	30	30.0	—
(22) 救急科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(23) 歯科・口腔外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-149. 【(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(24) その他の診療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-149.

【(3) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-製剤)】

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(2) 消化器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(3) 脳神経外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-149.【(3) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 整形外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(6) 産婦人科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	1	2	2	2.0	2	—
		全体	1	2	2	2.0	2	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	1	40	40	40.0	40	—
		全体	1	40	40	40.0	40	—
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(8) 泌尿器科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-149.【(3) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) その他の外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	1	1	1.0	1	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	1	1	1.0	1	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	20	20	20.0	20	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	20	20	20.0	20	—
(10) 血液内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	28	28	28.0	28	—
		300～499床	1	1	1	1.0	1	—
		500床以上	2	31	64	47.5	95	23.3
		全体	4	1	64	31.0	124	25.8
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	280	280	280.0	280	—
		300～499床	2	10	1,900	955.0	1,910	1,336.4
		500床以上	2	310	640	475.0	950	233.3
		全体	5	10	1,900	628.0	3,140	745.4
(11) 循環器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(12) 消化器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-149.【(3) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(14) 腎臓内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(15) 神経内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(16) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-149.【(3) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) 内分泌代謝科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(18) その他の内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	9	9	9.0	9	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	9	9	9.0	9	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	90	90	90.0	90	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	90	90	90.0	90	—
(19) 精神科・心療内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(20) 小児科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-149.【(3) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(21) 腫瘍治療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(22) 救急科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(23) 歯科・口腔外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(24) その他の診療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	60	60	60.0	60	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	60	60	60.0	60	—

1-150. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した血小板製剤の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください。

【(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板製剤)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	38	1	121	841	32.1
		300～499床	9	30	230	857	78.3
		500床以上	10	50	2,849	9,906	896.6
		全体	57	1	2,849	203.6	11,604
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	38	10	1,060	225.8	8,580
		300～499床	9	340	2,780	1,063.9	9,575
		500床以上	10	500	28,995	10,303.0	103,030
		全体	57	10	28,995	2,126.1	121,185
(2) 外来	袋(本)	0床	1	8	8	8.0	8
		1～299床	10	3	147	37.9	379
		300～499床	7	12	270	76.1	533
		500床以上	10	1	1,049	232.5	2,325
		全体	28	1	1,049	115.9	3,245
	単位	0床	1	80	80	80.0	80
		1～299床	10	30	1,470	395.0	3,950
		300～499床	7	140	2,710	842.9	5,900
		500床以上	10	10	13,135	2,609.5	26,095
		全体	28	10	13,135	1,286.6	36,025
(3) 救急外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	4	4	4.0	4
		500床以上	5	1	45	19.6	98
		全体	6	1	45	17.0	102
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	40	40	40.0	40
		500床以上	5	10	455	221.0	1,105
		全体	6	10	455	190.8	1,145

1-150.【(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板製剤)】(続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 手術室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	7	7.0	7	—
		300～499床	8	1	359	53.9	123.7
		500床以上	10	1	892	164.5	265.3
		全体	19	1	892	109.6	2,083
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	70	70.0	70	—
		300～499床	8	10	3,695	568.1	1,268.4
		500床以上	10	10	9,555	1,780.5	2,846.8
		全体	19	10	9,555	1,180.0	2,261.2
(5) 集中治療室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	5	23	380	176.0	880
		500床以上	7	37	814	222.9	1,560
		全体	12	23	814	203.3	2,440
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	5	285	4,310	1,914.0	9,570
		500床以上	7	345	8,675	2,357.1	16,500
		全体	12	285	8,675	2,172.5	26,070
(6) 医療機関外	袋(本)	0床	1	5	5	5.0	5
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	5	5	5.0	5
	単位	0床	1	50	50	50.0	50
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	50	50	50.0	50
(7) その他	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	101	101	101.0	101
		300～499床	1	1	1	1.0	1
		500床以上	1	1	1	1.0	1
		全体	3	1	101	34.3	103
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	1,010	1,010	1,010.0	1,010
		300～499床	1	10	10	10.0	10
		500床以上	1	10	10	10.0	10
		全体	3	10	1,010	343.3	1,030

1-150.

【(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-製剤)】

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	6	11	8.5	17	3.5
		500床以上	4	3	39	12.5	50	17.7
		全体	6	3	39	11.2	67	13.9
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	65	110	87.5	175	31.8
		500床以上	4	30	395	127.5	510	178.5
全体	6	30	395	114.2	685	140.5		
(2) 外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	11	12	11.5	23	0.7
		500床以上	1	1	1	1.0	1	—
		全体	3	1	12	8.0	24	6.1
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	115	120	117.5	235	3.5
		500床以上	1	10	10	10.0	10	—
全体	3	10	120	81.7	245	62.1		
(3) 救急外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
全体	0	—	—	—	—	—		
(4) 手術室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
全体	0	—	—	—	—	—		

1-150.【(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板HLA-製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 集中治療室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(6) 医療機関外	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(7) その他	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-150.

【(3) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-製剤)】

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	4	1	8	6.0	24	3.4
		300～499床	1	1	1	1.0	1	—
		500床以上	1	30	30	30.0	30	—
		全体	6	1	30	9.2	55	10.7
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	4	20	80	62.5	250	28.7
		300～499床	1	10	10	10.0	10	—
		500床以上	1	300	300	300.0	300	—
		全体	6	10	300	93.3	560	105.8
(2) 外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	3	1	72	31.3	94	36.6
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	2	2	64	33.0	66	43.8
		全体	5	1	72	32.0	160	33.9
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	3	10	720	313.3	940	366.1
		300～499床	1	1,900	1,900	1,900.0	1,900	—
		500床以上	2	20	640	330.0	660	438.4
		全体	6	10	1,900	583.3	3,500	712.9
(3) 救急外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-150.【(3) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-製剤)】(続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 手術室	袋(本)	0床	0	-	-	-	-	-
		1~299床	0	-	-	-	-	-
		300~499床	0	-	-	-	-	-
		500床以上	0	-	-	-	-	-
		全体	0	-	-	-	-	-
	単位	0床	0	-	-	-	-	-
		1~299床	0	-	-	-	-	-
		300~499床	0	-	-	-	-	-
		500床以上	0	-	-	-	-	-
		全体	0	-	-	-	-	-
(5) 集中治療室	袋(本)	0床	0	-	-	-	-	-
		1~299床	0	-	-	-	-	-
		300~499床	0	-	-	-	-	-
		500床以上	0	-	-	-	-	-
		全体	0	-	-	-	-	-
	単位	0床	0	-	-	-	-	-
		1~299床	0	-	-	-	-	-
		300~499床	0	-	-	-	-	-
		500床以上	0	-	-	-	-	-
		全体	0	-	-	-	-	-
(6) 医療機関外	袋(本)	0床	0	-	-	-	-	-
		1~299床	0	-	-	-	-	-
		300~499床	0	-	-	-	-	-
		500床以上	0	-	-	-	-	-
		全体	0	-	-	-	-	-
	単位	0床	0	-	-	-	-	-
		1~299床	0	-	-	-	-	-
		300~499床	0	-	-	-	-	-
		500床以上	0	-	-	-	-	-
		全体	0	-	-	-	-	-
(7) その他	袋(本)	0床	0	-	-	-	-	-
		1~299床	0	-	-	-	-	-
		300~499床	0	-	-	-	-	-
		500床以上	0	-	-	-	-	-
		全体	0	-	-	-	-	-
	単位	0床	0	-	-	-	-	-
		1~299床	0	-	-	-	-	-
		300~499床	0	-	-	-	-	-
		500床以上	0	-	-	-	-	-
		全体	0	-	-	-	-	-

3-5) 血漿製剤の使用実績について

1-151. 2019年4月～2020年3月の期間で、血漿製剤を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	2	1.2%	57	32.9%	14	8.1%	14	8.1%	87	50.3%
2	使用していない	29	16.8%	56	32.4%	0	0.0%	1	0.6%	86	49.7%
	回答施設合計	31		113		14		15		173	

1-152. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した血漿製剤の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0床	1	1	1	1.0	1	—
	1～299床	18	1	13	3.8	68	3.4
	300～499床	7	1	60	14.4	101	21.4
	500床以上	10	1	449	70.3	703	139.4
	全体	36	1	449	24.3	873	77.0
(2) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0床	2	9	10	9.5	19	0.7
	1～299床	49	1	966	62.4	3,057	164.2
	300～499床	14	3	1,567	499.9	6,999	544.7
	500床以上	14	4	4,618	1,331.3	18,638	1,412.1
	全体	79	1	4,618	363.5	28,713	793.7
(3) 新鮮凍結人血漿 (新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	21	1	159	24.1	507	39.4
	300～499床	9	2	250	58.9	530	81.6
	500床以上	14	1	1,564	384.1	5,377	459.1
	全体	44	1	1,564	145.8	6,414	304.9

【特別集計：血漿製剤の使用総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血漿製剤使用／袋(本)	0床	2	9	11	10.0	20	1.4
	1～299床	54	1	988	67.3	3,632	162.4
	300～499床	14	54	1,712	545.0	7,630	553.3
	500床以上	14	142	5,115	1,765.6	24,718	1,479.7
	全体	84	1	5,115	428.6	36,000	894.8
血漿製剤使用／単位	0床	2	18	21	19.5	39	2.1
	1～299床	54	1	2,014	152.0	8,210	341.9
	300～499床	14	116	3,648	1,158.5	16,219	1,138.3
	500床以上	14	295	10,825	4,249.1	59,487	3,251.1
	全体	84	1	10,825	999.5	83,955	2,051.6

【特別集計：一般病床数あたりの血漿製剤使用量】

一般病床数あたりの血漿製剤使用量(単位) (計算式：製剤別血液製剤使用量÷一般病床数)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 血漿製剤／単位	1～299床	54	0.0	20.8	1.7	89.8	3.5
	300～499床	14	0.4	10.9	3.3	46.2	3.4
	500床以上	14	0.6	15.7	6.1	85.8	4.5
	全体	82	0.0	20.8	2.7	221.7	4.0

1-153. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した血漿製剤の診療科別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	3	258	130.5	261
		300～499床	5	9	955	508.4	2,542
		500床以上	9	63	2,386	606.1	5,455
		全体	16	3	2,386	516.1	8,258
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	3	12	1,394	759.7	2,279
		300～499床	6	18	2,038	945.0	5,670
		500床以上	9	182	5,291	1,315.8	11,842
		全体	18	12	5,291	1,099.5	19,791
(2) 消化器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	12	1	107	45.6	547
		300～499床	6	1	252	76.7	460
		500床以上	9	2	269	134.2	1,208
		全体	27	1	269	82.0	2,215
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	13	1	320	111.1	1,444
		300～499床	7	2	514	177.6	1,243
		500床以上	9	4	1,060	358.6	3,227
		全体	29	1	1,060	203.9	5,914
(3) 脳神経外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	3	2	17	7.7	23
		300～499床	8	2	35	13.5	108
		500床以上	9	1	96	22.2	200
		全体	20	1	96	16.6	331
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	4	4	36	14.5	58
		300～499床	9	4	66	28.2	254
		500床以上	9	2	192	51.7	465
		全体	22	2	192	35.3	777
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	3	1	14	7.7	23
		500床以上	4	3	27	12.0	48
		全体	7	1	27	10.1	71
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	4	4	28	18.0	72
		500床以上	4	10	54	25.5	102
		全体	8	4	54	21.8	174

1-153. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 整形外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1~299床	11	1	12	4.1	3.8
		300~499床	7	1	25	13.9	9.5
		500床以上	9	1	41	10.6	12.8
		全体	27	1	41	8.8	9.7
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1~299床	11	2	106	19.5	214
		300~499床	8	4	50	27.0	216
		500床以上	9	4	92	23.3	210
		全体	28	2	106	22.9	640
(6) 産婦人科	袋(本)	0床	1	9	9	9.0	9
		1~299床	10	1	100	34.3	343
		300~499床	6	3	50	18.3	110
		500床以上	9	2	221	81.6	734
		全体	26	1	221	46.0	1,196
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1~299床	11	2	168	50.5	555
		300~499床	6	6	100	36.7	220
		500床以上	9	4	628	227.9	2,051
		全体	26	2	628	108.7	2,826
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1~299床	1	15	15	15.0	15
		300~499床	1	16	16	16.0	16
		500床以上	4	1	72	43.8	175
		全体	6	1	72	34.3	206
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1~299床	1	30	30	30.0	30
		300~499床	1	32	32	32.0	32
		500床以上	4	4	195	119.3	477
		全体	6	4	195	89.8	539
(8) 泌尿器科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1~299床	2	2	8	5.0	10
		300~499床	7	2	24	7.4	52
		500床以上	11	1	110	30.2	332
		全体	20	1	110	19.7	394
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1~299床	3	4	22	11.3	34
		300~499床	8	4	52	19.5	156
		500床以上	11	2	299	75.7	833
		全体	22	2	299	46.5	1,023

1-153. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) その他の外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	9	4	51	19.0	19.5
		300～499床	7	13	355	84.7	121.1
		500床以上	6	8	275	138.5	118.8
		全体	22	4	355	72.5	101.1
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	10	8	204	54.8	61.4
		300～499床	8	26	714	192.8	1,542
		500床以上	6	20	676	343.3	2,060
		全体	24	8	714	172.9	4,150
(10) 血液内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	1	1	1.0	—
		300～499床	4	2	58	20.5	25.5
		500床以上	7	42	105	84.0	588
		全体	12	1	105	55.9	671
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	2	2	2.0	—
		300～499床	5	8	418	119.0	595
		500床以上	7	84	376	214.7	1,503
		全体	13	2	418	161.5	2,100
(11) 循環器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	4	4	4.0	—
		300～499床	8	3	164	52.3	418
		500床以上	8	9	414	96.6	773
		全体	17	3	414	70.3	1,195
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	8	286	147.0	294
		300～499床	8	6	336	106.8	854
		500床以上	8	18	896	218.3	1,746
		全体	18	6	896	160.8	2,894
(12) 消化器内科	袋(本)	0床	1	11	11	11.0	—
		1～299床	1	6	6	6.0	—
		300～499床	9	5	123	35.3	318
		500床以上	9	2	108	39.6	356
		全体	20	2	123	34.6	691
	単位	0床	1	21	21	21.0	—
		1～299床	1	12	12	12.0	—
		300～499床	9	10	292	87.4	787
		500床以上	9	4	432	112.3	1,011
		全体	20	4	432	91.6	1,831

1-153. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	5	2	38	12.2	61
		全体	5	2	38	12.2	61
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	5	8	76	26.6	133
		全体	5	8	76	26.6	133
(14) 腎臓内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	110	110	110.0	110
		300～499床	6	2	116	38.5	231
		500床以上	6	2	234	78.7	472
		全体	13	2	234	62.5	813
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	216	216	216.0	216
		300～499床	6	4	462	131.0	786
		500床以上	6	4	730	265.2	1,591
		全体	13	4	730	199.5	2,593
(15) 神経内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	7	15	11.0	22
		500床以上	5	2	105	42.0	210
		全体	7	2	105	33.1	232
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	14	30	22.0	44
		500床以上	5	6	414	162.4	812
		全体	7	6	414	122.3	856
(16) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	14	14	14.0	14
		500床以上	2	10	118	64.0	128
		全体	3	10	118	47.3	142
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	52	52	52.0	52
		500床以上	2	20	448	234.0	468
		全体	3	20	448	173.3	520

1-153. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) 内分泌代謝科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	2	2	2.0	2
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	2	2	2.0	2
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	4	4	4.0	4
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	4	4	4.0	4
(18) その他の内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	8	1	93	24.6	197
		300～499床	7	4	53	18.0	126
		500床以上	7	1	23	9.4	66
		全体	22	1	93	17.7	389
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	9	2	274	78.4	706
		300～499床	7	8	125	38.7	271
		500床以上	7	4	76	24.4	171
		全体	23	2	274	49.9	1,148
(19) 精神科・心療内科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	1	5	5	5.0	5
		全体	1	5	5	5.0	5
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	1	10	10	10.0	10
		全体	1	10	10	10.0	10
(20) 小児科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	2	2	2.0	2
		500床以上	5	1	687	176.4	882
		全体	6	1	687	147.3	884
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	4	4	4.0	4
		500床以上	5	1	1,304	353.8	1,769
		全体	6	1	1,304	295.5	1,773

1-153. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(21) 腫瘍治療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	3	3	3.0	3
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	3	3	3.0	3
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	5	5	5.0	5
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	5	5	5.0	5
(22) 救急科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	1	1	1.0	1
		300～499床	5	4	253	70.6	353
		500床以上	9	1	1,050	394.7	3,552
		全体	15	1	1,050	260.4	3,906
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	2	2	2.0	2
		300～499床	6	14	572	204.0	1,224
		500床以上	9	4	2,120	939.7	8,457
		全体	16	2	2,120	605.2	9,683
(23) 歯科・口腔外科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(24) その他の診療科	袋(本)	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	2	13	7.5	15
		300～499床	3	3	52	19.7	59
		500床以上	5	3	409	93.2	466
		全体	10	2	409	54.0	540
	単位	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	8	30	19.0	38
		300～499床	4	8	106	35.0	140
		500床以上	5	12	818	188.6	943
		全体	11	8	818	101.9	1,121

1-154. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した血漿製剤の使用場所別に総袋(本)数と使用単位数を記入してください。

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0床	1	9	9	9.0	9	—
		1～299床	39	1	178	26.9	1,050	35.5
		300～499床	9	9	176	87.0	783	57.2
		500床以上	10	106	1,829	536.4	5,364	602.6
		全体	59	1	1,829	122.1	7,206	306.1
	単位	0床	1	18	18	18.0	18	—
		1～299床	38	1	566	69.4	2,639	102.7
		300～499床	9	18	346	177.7	1,599	113.6
		500床以上	10	211	3,752	1,374.1	13,741	1,449.2
		全体	58	1	3,752	310.3	17,997	762.7
(2) 外来	袋(本)	0床	1	11	11	11.0	11	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	3	3	55	26.0	78	26.5
		500床以上	5	2	233	53.0	265	100.9
		全体	9	2	233	39.3	354	74.5
	単位	0床	1	21	21	21.0	21	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	3	6	172	72.7	218	87.7
		500床以上	5	4	502	114.0	570	217.3
		全体	9	4	502	89.9	809	163.1
(3) 救急外来	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	2	5	6	5.5	11	0.7
		300～499床	2	14	26	20.0	40	8.5
		500床以上	9	2	463	125.4	1,129	152.4
		全体	13	2	463	90.8	1,180	135.8
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	2	14	20	17.0	34	4.2
		300～499床	2	28	52	40.0	80	17.0
		500床以上	9	6	926	256.2	2,306	303.4
		全体	13	6	926	186.2	2,420	271.0
(4) 手術室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	13	4	156	29.1	378	41.9
		300～499床	8	10	1,051	191.1	1,529	353.6
		500床以上	9	30	3,053	793.7	7,143	929.2
		全体	30	4	3,053	301.7	9,050	617.2
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	13	8	531	77.2	1,003	140.4
		300～499床	8	19	2,102	382.1	3,057	707.2
		500床以上	9	60	6,571	1,834.3	16,509	2,022.9
		全体	30	8	6,571	685.6	20,569	1,363.3

1-154. (続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 集中治療室	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	102	102	102.0	102	—
		300～499床	5	102	603	306.2	1,531	224.8
		500床以上	7	111	1,530	631.9	4,423	451.5
		全体	13	102	1,530	465.8	6,056	395.6
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	342	342	342.0	342	—
		300～499床	5	204	1,206	623.0	3,115	444.7
		500床以上	7	291	3,150	1,437.1	10,060	868.5
		全体	13	204	3,150	1,039.8	13,517	805.1
(6) 医療機関外	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(7) その他	袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	8	8	8.0	8	—
		500床以上	2	33	99	66.0	132	46.7
		全体	3	8	99	46.7	140	47.0
	単位	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	26	26	26.0	26	—
		500床以上	2	114	298	206.0	412	130.1
		全体	3	26	298	146.0	438	138.8

3-6) 日赤製剤の発注について

1-155. 日赤への輸血用血液製剤の注文方法は？

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	手書きしたものをFax送信する	28	16.1%	94	54.0%	12	6.9%	10	5.7%	144	82.8%
2	印刷した物をFax送信する	2	1.1%	7	4.0%	1	0.6%	1	0.6%	11	6.3%
3	輸血システムから直接Fax送信する	0	0.0%	1	0.6%	1	0.6%	2	1.1%	4	2.3%
4	Webシステムで注文する	0	0.0%	5	2.9%	0	0.0%	1	0.6%	6	3.4%
5	電話で注文する	2	1.1%	5	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.0%
6	その他	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	2	1.1%
	回答施設合計	32		113		14		15		174	

3-7) 院内調製の製剤について

1-156. 2019年4月～2020年3月の期間に院内で下記製剤を調製したことがありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	調製した	1	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	4	2.4%	6	3.5%
2	調製していない	32	18.8%	109	64.1%	13	7.6%	10	5.9%	164	96.5%
	回答施設合計	33		109		14		14		170	

【該当する院内調製血】

院内調製洗浄血小板製剤	院内分割製剤
同種クリオプレシピート製剤	

1-157. 2019年4月～2020年3月の期間に院内で洗浄置換もしくは置換血小板を調製したことがありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	調製した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	16.7%
2	調製していない	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	3	50.0%	5	83.3%
	回答施設合計	1		0		1		4		6	

洗浄置換もしくは置換血小板を調製した件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	－	－	－	－	－
1～299床	0	－	－	－	－	－
300～499床	0	－	－	－	－	－
500床以上	1	2	2	2.0	2	－
全体	1	2	2	2.0	2	－

1-158. 2019年4月～2020年3月の期間に院内で分割した赤血球液を使用したことがありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
2	いいえ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

1-159. 問1-158で「(1) はい」の場合、2019年4月～2020年3月の期間に院内で分割した赤血球を使用した患者数(実数)と元製剤の本数と分割したパックの輸血した本数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 分割した赤血球を使用した患者数(実数) / 人	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	4	6	22	12.5	50	7.5
	全体	4	6	22	12.5	50	7.5
(2) 元製剤の本数/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	152	152	152.0	152	—
	500床以上	4	6	64	29.5	118	28.2
	全体	5	6	152	54.0	270	60.0
(3) 分割パックの輸血した本数(輸血件数)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	339	339	339.0	339	—
	500床以上	4	6	177	69.8	279	79.2
	全体	5	6	339	123.6	618	138.6

1-160. 問1-158で「(2) いいえ」の場合、分割しない理由は何ですか

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	対象症例がない	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
2	対象症例があるができない (設備:無菌接合機・シーラーがない)	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
3	対象症例があるができない (人的余裕がない)	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
4	カリウム吸着フィルターを使用すると初流廃棄量が多いため、分割できないと判断している	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
5	その他	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	回答施設合計	0		0		0		0		0	

1-162. 2019年4月～2020年3月の期間に院内で分割した濃厚血小板を使用したことがありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	いいえ	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

1-164. 問1-162で「(2) いいえ」の場合、分割しない理由は何ですか

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	対象症例がない	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	3	37.5%	4	50.0%
2	対象症例があるができない (設備:無菌接合機・シーラーがない)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	対象症例があるができない (人的余裕がない)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	濃厚血小板の有効期限が短く分割効果が期待できないと判断している	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	2	25.0%	3	37.5%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%
	回答施設合計	0		0		2		6		8	

1-166. 2019年4月～2020年3月の期間で血漿製剤(新鮮凍結血漿-LR-120、新鮮凍結血漿-LR-240、新鮮凍結血漿-LR-480)からクリオプレシビートを作成し使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%
2	使用していない	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	3	60.0%	4	80.0%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

1-167. 2019年4月～2020年3月の期間に作成し使用した、クリオプレシビートの調製用製剤となった血漿製剤の使用総袋(本)数を、患者同型供給の場合は(1)に、AB型供給のみに統一している場合は(2)に記入して下さい。

【(1) 患者血液型同型 新鮮凍結人血漿】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結血漿-LR-120製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) 新鮮凍結血漿-LR-240製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) 新鮮凍結血漿-LR-480製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

【(2) AB型 新鮮凍結人血漿】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結血漿-LR-120製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) 新鮮凍結血漿-LR-240製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) 新鮮凍結血漿-LR-480製剤／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	10	10	10.0	10	—
	全体	1	10	10	10.0	10	—

3-8) 放射線未照射輸血用血液製剤使用について

1-168. 2019年4月～2020年3月の期間で放射線未照射輸血用血液製剤(日赤製剤・院内製剤)を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	使用していない	33	19.1%	111	64.2%	14	8.1%	15	8.7%	173	100.0%
	回答施設合計	33		111		14		15		173	

1-169. 2019年4月～2020年3月の期間に輸血が行われた放射線未照射輸血用血液製剤(日赤製剤・院内製剤)の製剤別単位数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 未照射日赤赤血球製剤／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) 未照射日赤血小板製剤／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) 未照射院内採血赤血球製剤／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(4) 未照射院内採血血小板製剤／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

3-9) 外来輸血について

1-171. 2019年4月～2020年3月の期間で外来にて輸血をおこないましたか

(但し、救急外来での輸血は除く)

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	17	9.7%	48	27.3%	13	7.4%	14	8.0%	92	52.3%
2	いいえ	16	9.1%	66	37.5%	1	0.6%	1	0.6%	84	47.7%
	回答施設合計	33		114		14		15		176	

1-172. 2019年4月～2020年3月の期間で外来にて輸血をおこなった製剤毎の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 赤血球製剤／件	0床	16	1	198	24.9	399	48.6
	1～299床	41	2	419	46.0	1,886	79.0
	300～499床	9	5	991	288.6	2,597	293.4
	500床以上	12	69	4,834	942.3	11,308	1,290.5
	全体	78	1	4,834	207.6	16,190	596.9
(2) 血小板製剤／件	0床	2	8	13	10.5	21	3.5
	1～299床	15	1	119	37.2	558	42.9
	300～499床	7	12	983	253.3	1,773	342.1
	500床以上	12	1	1,355	324.5	3,894	444.5
	全体	36	1	1,355	173.5	6,246	318.5
(3) 血漿製剤／件	0床	2	1	3	2.0	4	1.4
	1～299床	1	4	4	4.0	4	—
	300～499床	1	6	6	6.0	6	—
	500床以上	5	1	981	201.2	1,006	435.9
	全体	9	1	981	113.3	1,020	325.4

1-173. 外来輸血の実施場所

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	外来処置室	5	4.8%	33	31.7%	13	12.5%	13	12.5%	64	61.5%
2	外来の空いている診察室	0	0.0%	6	5.8%	1	1.0%	3	2.9%	10	9.6%
3	輸血部のベッド	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	病棟の空きベッド	0	0.0%	5	4.8%	2	1.9%	0	0.0%	7	6.7%
5	その他	12	11.5%	9	8.7%	0	0.0%	2	1.9%	23	22.1%
	回答施設合計	17		53		16		18		104	

1-174. 外来輸血後、院内で経過観察する時間を設けていますか(会計等のための待ち時間は含みません)

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	14	15.6%	34	37.8%	6	6.7%	8	8.9%	62	68.9%
2	いない	3	3.3%	12	13.3%	7	7.8%	6	6.7%	28	31.1%
	回答施設合計	17		46		13		14		90	

1-175. 経過観察する時間は

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	30分未満	0	0.0%	11	18.0%	2	3.3%	3	4.9%	16	26.2%
2	30分～60分	7	11.5%	21	34.4%	3	4.9%	5	8.2%	36	59.0%
3	60分以上	7	11.5%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	9	14.8%
	回答施設合計	14		34		5		8		61	

1-176. 帰宅後に見られる輸血関連有害事象(または輸血副作用)の説明を行っていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	文書・口頭で実施している	9	10.3%	21	24.1%	3	3.4%	7	8.0%	40	46.0%
2	口頭で実施している	5	5.7%	16	18.4%	8	9.2%	6	6.9%	35	40.2%
3	文章を渡すのみ	1	1.1%	3	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.6%
4	実施していない	1	1.1%	5	5.7%	1	1.1%	1	1.1%	8	9.2%
	回答施設合計	16		45		12		14		87	

1-177. 帰宅後の連絡先について説明していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	文書・口頭で実施している	8	9.0%	16	18.0%	2	2.2%	7	7.9%	33	37.1%
2	口頭で実施している	6	6.7%	23	25.8%	8	9.0%	5	5.6%	42	47.2%
3	文章を渡すのみ	1	1.1%	3	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.5%
4	実施していない	2	2.2%	4	4.5%	2	2.2%	2	2.2%	10	11.2%
	回答施設合計	17		46		12		14		89	

1-178. 2019年4月～2020年3月の期間に外来輸血で帰宅後に発生した輸血副作用への対応について

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	連携医療機関で対応してもらった	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	近隣救急センターを利用してもらった	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	救急外来で対応した	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%	2	2.2%	5	5.4%
4	翌日に外来を受診してもらった	1	1.1%	2	2.2%	0	0.0%	1	1.1%	4	4.3%
5	往診した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	電話連絡のみで済ませた	1	1.1%	1	1.1%	0	0.0%	2	2.2%	4	4.3%
7	連絡はなかった	14	15.2%	42	45.7%	9	9.8%	10	10.9%	75	81.5%
8	連絡を受ける体制がない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%
9	その他	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	3	3.3%
	回答施設合計	18		48		9		17		92	

3-10) 病院外(介護施設・在宅)輸血について

1-179. 2019年4月～2020年3月の期間に病院外(介護施設・在宅)で輸血を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いいえ	27	15.4%	113	64.6%	13	7.4%	14	8.0%	167	95.4%
2	関連病院と連携して介護施設・在宅両方で実施した	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
3	関連病院と連携して介護施設で実施した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	関連病院と連携して在宅で実施した	0	0.0%	1	0.6%	1	0.6%	1	0.6%	3	1.7%
5	関連病院と連携なく介護施設・在宅両方で実施した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	関連病院と連携なく介護施設で実施した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	関連病院と連携なく在宅で実施した	4	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.3%
	回答施設合計	32		114		14		15		175	

1-180. 病院外で輸血を実施した患者さんに特別な理由の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病院まで距離が遠いため	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) 通院困難	0床	3	1	20	7.3	22	11.0
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	3	1	20	7.3	22	11.0
(3) 在宅治療を行っているため	0床	5	1	20	5.8	29	8.0
	1～299床	1	11	11	11.0	11	—
	300～499床	1	2	2	2.0	2	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	7	1	20	6.0	42	7.1
(4) 終末期医療のため	0床	1	1	1	1.0	1	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	1	1	1.0	1	—
(5) 病診連携で病院より依頼されたため	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(6) 患者さんからの希望	0床	1	20	20	20.0	20	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	20	20	20.0	20	—
(7) その他	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

1-181. 問1-180で「(2) 通院困難」の場合、通院困難な理由の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 交通事情	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) 寝たきり	0床	1	1	1	1.0	1	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	1	1	1.0	1	—
(3) 身体障碍	0床	1	10	10	10.0	10	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	10	10	10.0	10	—
(4) 認知症	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(5) その他	0床	1	20	20	20.0	20	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	20	20	20.0	20	—

1-182. 問1-180で「(3) 在宅治療を行っているため」の場合、患者さんの疾患の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 腎臓疾患(透析など)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	9	9	9.0	9	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	9	9	9.0	9	—
(2) 血液疾患(貧血など)	0床	2	1	1	1.0	2	0.0
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	2	1	1	1.0	2	0.0
(3) 血液悪性疾患(MDS、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(4) 悪性新生物	0床	1	1	1	1.0	1	—
	1～299床	1	2	2	2.0	2	—
	300～499床	1	2	2	2.0	2	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	3	1	2	1.7	5	0.6
(5) 消化器疾患(悪性新生物は除く)	0床	1	1	1	1.0	1	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	1	1	1.0	1	—
(6) 産婦人科疾患(悪性新生物は除く)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(7) その他	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

1-183. インフォームド・コンセント(IC)について

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	病院内輸血と同じ説明・同意書で行っている	2	28.6%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	3	42.9%
2	病院外(介護施設・在宅)輸血用の説明・同意書を別に作成し使用している	3	42.9%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	57.1%
3	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	5		1		1		0		7	

1-184. 赤血球製剤を保存する場合、保冷庫は以下のいずれですか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液製剤専用の自記式温度記録装置付き保冷庫	0	0.0%	1	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	2	28.6%
2	血液製剤専用で使用している保冷庫	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%
3	薬品と同じ保冷庫	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	57.1%
4	保冷ボックス	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	5		1		1		0		7	

1-185. 複数人分の輸血用血液製剤を同じ場所で保管することがありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	2	28.6%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%
2	ない	3	42.9%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	4	57.1%
	回答施設合計	5		1		1		0		7	

1-186. 病院外(介護施設・在宅)輸血を行う場合に交差適合試験を実施していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	自院で必ず行っている	0	0.0%	1	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	2	28.6%
2	院外の検査センターで必ず行っている	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%
3	関連病院で必ず行っている	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	自院、院外の検査センターもしくは 関連病院で必ず行っている	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%
5	症例によって実施したりしなかったりする	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	実施していない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	5		1		1		0		7	

1-187. 輸血前後の感染症検査(HBV、HCV、HIV)は

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	院内と同様に実施している	1	14.3%	1	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	3	42.9%
2	ほとんど実施していない	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	57.1%
3	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	5		1		1		0		7	

1-188. 輸血前後の検体保存は

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	院内と同様に実施している	0	0.0%	1	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	2	28.6%
2	ほとんど実施していない	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	71.4%
3	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	5		1		1		0		7	

1-189. 病院外(介護施設・在宅)輸血を行う場合に実施困難な検査は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液型検査の二重チェック	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%
2	血液型検査のウラ試験	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%
3	不規則抗体スクリーニング検査	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%
4	抗免疫グロブリン法による交差適合試験	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%
5	輸血前感染症検査(肝炎ウイルスマーカー)	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	16.7%
6	輸血後感染症検査(肝炎ウイルスマーカー)	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	3	25.0%
	回答施設合計	10		0		0		2		12	

1-190. 輸血の実施者は誰ですか

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	5	45.5%	0	0.0%	1	9.1%	1	9.1%	7	63.6%
2	輸血担当施設の看護師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	9.1%
3	訪問看護ステーションの看護師	2	18.2%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	27.3%
4	連携病院の看護師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	7		1		1		2		11	

1-191. 病院外(介護施設・在宅)輸血後の患者観察(5分後、15分後)は行っていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	病院内輸血と同様に行っている	2	28.6%	1	14.3%	1	14.3%	1	14.3%	5	71.4%
2	不十分ながら担当者が行っている	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%
3	ほとんど行っていない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	4		1		1		1		7	

1-192. 輸血中に付添う医療従事者は誰ですか

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	3	21.4%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	4	28.6%
2	輸血担当施設の看護師	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	2	14.3%
3	訪問看護ステーションの看護師	5	35.7%	1	7.1%	1	7.1%	0	0.0%	7	50.0%
4	連携病院の看護師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
	回答施設合計	9		2		2		1		14	

1-193. 輸血中に医療従事者以外で付き添う方は誰ですか

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	患者さんの家族	5	45.5%	0	0.0%	1	9.1%	1	9.1%	7	63.6%
2	患者さんの隣人・知人	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	ヘルパー	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%
4	いない(独居)	1	9.1%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%
5	その他	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%
	回答施設合計	8		1		1		1		11	

1-194. 輸血終了時に抜針をするのは誰ですか

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	2	18.2%
2	輸血担当施設の看護師	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	3	27.3%
3	訪問看護ステーションの看護師	4	36.4%	1	9.1%	1	9.1%	0	0.0%	6	54.5%
4	連携病院の看護師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	7		1		1		2		11	

1-195. 輸血バッグの廃棄方法は

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設で廃棄	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	71.4%
2	訪問看護ステーションで廃棄	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%
3	連携病院で廃棄	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%
4	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	5		1		1		0		7	

1-196. 病院外(介護施設・在宅)輸血を行う場合、自施設では実施困難な項目は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血開始	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%
2	輸血中の観察	2	15.4%	1	7.7%	1	7.7%	0	0.0%	4	30.8%
3	輸血終了中の有害事象への対応	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%
4	輸血後の抜針	0	0.0%	1	7.7%	1	7.7%	0	0.0%	2	15.4%
5	輸血終了後の輸血バッグの廃棄	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%
6	輸血終了後(患家を離れた後)の有害事象への対応	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	23.1%
	回答施設合計	7		4		2		0		13	

1-197. 病院外(介護施設・在宅)輸血を行う場合、訪問看護ステーションで実施困難な項目は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血開始	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%
2	輸血中の観察	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%
3	輸血終了中の有害事象への対応	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%
4	輸血後の抜針	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	輸血終了後の輸血バッグの廃棄	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%
6	輸血終了後(患家を離れた後)の有害事象への対応	2	20.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	4	40.0%
	回答施設合計	8		0		1		1		10	

1-198. 2019年4月～2020年3月の期間で行った病院外(介護施設・在宅)輸血の延べ件数は

病院外(介護施設・在宅)輸血の件数(件)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 赤血球製剤	0床	4	1	20	9.3	37	7.9
	1～299床	1	11	11	11.0	11	－
	300～499床	1	2	2	2.0	2	－
	500床以上	0	－	－	－	－	－
	全体	6	1	20	8.3	50	6.9
(2) 血小板製剤	0床	1	5	5	5.0	5	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	0	－	－	－	－	－
	全体	1	5	5	5.0	5	－
(3) 血漿製剤	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	0	－	－	－	－	－
	全体	0	－	－	－	－	－

1-199. 病院外(介護施設・在宅)輸血後の副作用発症時の対応策は決めていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	病院内輸血と同様に行っている	0	0.0%	1	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	2	28.6%
2	連絡をもらい適切な処置をとるように決めている	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	71.4%
3	関連病院と連携をとり適切な処置を取るように決めている	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	特に決めていない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	5		1		1		0		7	

3-11) 輸血副作用について

1-200. 2019年4月～2020年3月の期間で、輸血副作用が発生しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	1	0.6%	30	17.3%	13	7.5%	14	8.1%	58	33.5%
2	発生していない	31	17.9%	75	43.4%	0	0.0%	1	0.6%	107	61.8%
3	把握していない	1	0.6%	7	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	4.6%
	回答施設合計	33		112		13		15		173	

1-201. 2019年4月～2020年3月の期間で、輸血副作用が発生した件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 発熱	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	14	1	24	8.1	113	8.9
	300～499床	8	1	65	18.8	150	20.3
	500床以上	13	1	187	41.6	541	57.5
	全体	35	1	187	23.0	804	38.9
(2) 悪寒・戦慄	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	6	1	5	2.2	13	1.5
	300～499床	5	1	13	4.6	23	5.4
	500床以上	9	1	95	14.6	131	30.4
	全体	20	1	95	8.4	167	20.7
(3) 熱感・ほてり	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	7	1	6	2.6	18	1.8
	300～499床	4	1	6	2.8	11	2.2
	500床以上	4	2	74	24.8	99	33.1
	全体	15	1	74	8.5	128	18.4
(4) 掻痒感・かゆみ	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	9	1	12	2.7	24	3.6
	300～499床	7	1	100	19.3	135	36.4
	500床以上	9	1	82	34.9	314	30.5
	全体	25	1	100	18.9	473	29.0

1-201. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 発赤・顔面紅潮	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	8	1	5	2.0	16	1.3
	300～499床	6	1	5	2.0	12	1.5
	500床以上	7	1	67	21.3	149	23.7
	全体	21	1	67	8.4	177	16.0
(6) 発疹・蕁麻疹	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	14	1	3	1.5	21	0.8
	300～499床	11	1	25	4.6	51	6.9
	500床以上	13	4	115	48.0	624	42.4
	全体	38	1	115	18.3	696	32.7
(7) 呼吸困難	0床	1	1	1	1.0	1	—
	1～299床	3	1	1	1.0	3	0.0
	300～499床	7	1	7	2.1	15	2.3
	500床以上	7	1	6	2.3	16	1.8
	全体	18	1	7	1.9	35	1.8
(8) 嘔気・嘔吐	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	7	1	2	1.3	9	0.5
	300～499床	5	1	3	1.4	7	0.9
	500床以上	8	1	9	4.0	32	2.7
	全体	20	1	9	2.4	48	2.2
(9) 胸痛・腹痛・腰背部痛	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	2	2	2.0	2	—
	500床以上	3	1	2	1.3	4	0.6
	全体	4	1	2	1.5	6	0.6
(10) 頭痛・頭重感	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	4	1	2	1.5	6	0.6
	500床以上	4	1	3	2.0	8	0.8
	全体	8	1	3	1.8	14	0.7
(11) 血圧低下	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	5	1	14	4.0	20	5.7
	300～499床	5	1	5	2.6	13	1.8
	500床以上	10	1	12	4.9	49	3.7
	全体	20	1	14	4.1	82	3.8

1-201. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(12) 血圧上昇	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	4	1	39	12.3	49	18.1
	300～499床	5	1	16	4.4	22	6.5
	500床以上	8	1	18	5.3	42	6.3
	全体	17	1	39	6.6	113	10.0
(13) 動悸・頻脈	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	3	1	13	5.0	15	6.9
	300～499床	1	8	8	8.0	8	—
	500床以上	4	1	3	1.8	7	1.0
	全体	8	1	13	3.8	30	4.4
(14) 血管痛	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	2	2	2	2.0	4	0.0
	300～499床	2	1	1	1.0	2	0.0
	500床以上	2	2	5	3.5	7	2.1
	全体	6	1	5	2.2	13	1.5
(15) 意識障害	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	2	1	1	1.0	2	0.0
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	3	1	1	1.0	3	0.0
	全体	5	1	1	1.0	5	0.0
(16) 赤褐色尿	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	8	8	8.0	8	—
	全体	1	8	8	8.0	8	—
(17) その他	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	2	1	6	3.5	7	3.5
	300～499床	4	2	20	8.8	35	7.9
	500床以上	8	1	9	5.1	41	3.0
	全体	14	1	20	5.9	83	4.9

3-12) ヘキ地・離島における輸血管理について

1-202. 貴院は、ヘキ地・離島に該当する施設ですか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ヘキ地に該当する	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
2	離島に該当する	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	ヘキ地・離島に該当しない	31	18.0%	111	64.5%	14	8.1%	15	8.7%	171	99.4%
	回答施設合計	31		112		14		15		172	

1-203. 血液センターからの血液製剤の定期搬送にかかる時間はどの位ですか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	1.0-1.4時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	1.5-1.9時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	2.0-2.4時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	2.5-2.9時間	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
5	3.0-3.9時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	4.0-4.9時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	5.0-5.9時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	6.0-6.9時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	7.0時間以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

1-204. 気象状況により血液製剤搬送ができないことがありますか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
2	ない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

1-205. 夜間に緊急輸血が必要になった際に患者をより高次施設へ搬送する体制は確立していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	確立している	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
2	確立していない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

1-206. 平日14時に緊急輸血を発注した際、血液製剤が届くまでにどの位かかりますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	1.0-1.4時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	1.5-1.9時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	2.0-2.4時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	2.5-2.9時間	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
5	3.0-3.9時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	4.0-4.9時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	5.0-5.9時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	6.0-6.9時間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	7.0時間以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

1-207. 輸血の安全性向上や適正使用推進を図るための定期的な会議等がありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
2	ない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

1-208. 血液製剤の院内在庫量(単位数)をご教示下さい

【(1) 人赤血球液製剤(RBC)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) A型／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) O型／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) B型／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(4) AB型／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

【(2) 新鮮凍結人血漿(FFP)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) A型／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) O型／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) B型／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(4) AB型／単位	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

1-209. 不適合輸血防止対策等のうち、貴院で行われているものをご教示下さい。

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液型は、違うタイミングで2回採血した検体によるダブルチェック後に確定している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	血液製剤受け渡し時には医療従事者2名によりチェックしている	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
3	ナースステーション等での血液製剤の準備は1回1患者毎としている	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
4	ベッドサイドでの患者と血液製剤の確認は医療従事者2名で行っている	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	血液製剤バッグには特定の患者用であることを示す表示(適合票など)を付けている	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
6	不適合輸血発生時の対応マニュアルがある	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
	回答施設合計	0		4		0		0		4	

1-210. 異型適合血を積極的に利用していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	利用している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	利用していない	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
3	どちらともいえない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

1-211. 院内で採血された血液(院内血)を輸血したことがありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	ない	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

1-212. 貴院で重篤な病態をもつ、輸血を必要とする患者(急性大量出血など)が発生した場合の対応についてご教示下さい。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	地域の中核病院へ救急車で搬送	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	地域の中核病院へヘリコプター等で搬送	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	近隣の病院へ救急車で搬送	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	可能な限り自院で対応	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

1-213. 貴院では地域の病院から緊急避難的に血液製剤の提供を受けたことがありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
2	ない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

過去3年間の症例数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	—	—	—	—	—
1～299床	0	—	—	—	—	—
300～499床	0	—	—	—	—	—
500床以上	0	—	—	—	—	—
全体	0	—	—	—	—	—

1-214. 問1-213で「(1)ある」と回答された方へ、その際の患者さんの病態について

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	外傷による出血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	消化管出血	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
3	手術時の出血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	産科的出血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	血液疾患での貧血の急激な進行	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	悪性疾患での貧血の急激な進行	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	原因不明の高度の貧血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

1-217. 貴院での輸血医療に関して地域中核病院等からの協力・支援体制はありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
2	ない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		1		0		0		1	

3-13) 自己血製剤使用の実績について

1-218. 2019年4月～2020年3月の期間で自己血(貯血式・希釈式・回収式)を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.0%	28	16.0%	12	6.9%	14	8.0%	54	30.9%
2	使用していない	33	18.9%	85	48.6%	2	1.1%	1	0.6%	121	69.1%
	回答施設合計	33		113		14		15		175	

1-219. 2019年4月～2020年3月の期間で貯血式自己血を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.0%	28	51.9%	11	20.4%	14	25.9%	53	98.1%
2	使用していない	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.9%
	回答施設合計	0		28		12		14		54	

1-220. 2019年4月～2020年3月の期間で貯血式自己血採血の症例数(実患者数)は

貯血式自己血採血の症例数(人)						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	—	—	—	—	—
1～299床	28	1	234	34.0	953	45.5
300～499床	11	3	630	97.5	1,073	184.9
500床以上	13	15	508	129.2	1,679	148.2
全体	52	1	630	71.3	3,705	121.4

1-221. 2019年4月～2020年3月の期間で貯血式自己血採血の総件数は

貯血式自己血輸血採血の総件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0床	0	—	—	—	—	—
1～299床	28	2	234	45.3	1,267	54.2
300～499床	11	3	1,365	198.5	2,183	399.0
500床以上	13	17	689	177.9	2,313	190.0
全体	52	2	1,365	110.8	5,763	215.5

1-222. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した貯血式自己血の使用総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 貯血式自己血(200mL)使用総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	9	1	146	18.8	169	47.8
	300～499床	6	1	423	76.3	458	170.0
	500床以上	13	1	86	17.2	224	23.1
	全体	28	1	423	30.4	851	82.8
(2) 貯血式自己血(400mL)使用総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	26	1	145	32.5	846	38.0
	300～499床	11	3	879	132.5	1,457	256.0
	500床以上	14	14	651	171.4	2,399	186.6
	全体	51	1	879	92.2	4,702	163.8

【特別集計：貯血式自己血の使用総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血の使用総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	28	2	146	36.3	1,015	42.8
	300～499床	11	3	1,302	174.1	1,915	380.4
	500床以上	14	17	689	187.4	2,623	203.0
	全体	53	2	1,302	104.8	5,553	210.8
貯血式自己血の総単位数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	28	3	291	66.5	1,861	75.6
	300～499床	11	6	2,181	306.5	3,372	635.9
	500床以上	14	31	1,340	358.7	5,022	389.3
	全体	53	3	2,181	193.5	10,255	370.6

【特別集計：一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量】

一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量(単位) (計算式：貯血式自己血製剤使用量÷一般病床数)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血／単位	1～299床	28	0.0	2.9	0.8	22.1	0.8
	300～499床	11	0.0	5.4	0.8	8.5	1.6
	500床以上	14	0.0	2.1	0.5	7.4	0.6
	全体	53	0.0	5.4	0.7	38.0	1.0

1-223. 2019年4月～2020年3月の期間で使用せずに廃棄した貯血式自己血はありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	17	32.7%	8	15.4%	13	25.0%	38	73.1%
2	ない	0	0.0%	10	19.2%	3	5.8%	1	1.9%	14	26.9%
	回答施設合計	0		27		11		14		52	

1-224. 2019年4月～2020年3月の期間で使用せずに廃棄した、貯血式自己血の総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1)貯血式自己血(200mL)廃棄総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	5	1	30	7.0	35	12.9
	300～499床	4	1	20	10.5	42	9.9
	500床以上	6	1	58	10.8	65	23.1
	全体	15	1	58	9.5	142	16.2
(2)貯血式自己血(400mL)廃棄総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	15	1	36	12.6	189	11.8
	300～499床	8	2	57	17.6	141	19.0
	500床以上	13	1	72	26.1	339	22.8
	全体	36	1	72	18.6	669	18.5

【特別集計:貯血式自己血の廃棄総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血の廃棄総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	17	1	36	13.2	224	12.1
	300～499床	8	2	57	22.9	183	22.2
	500床以上	13	1	90	31.1	404	28.9
	全体	38	1	90	21.3	811	22.2
貯血式自己血の総単位数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	17	1	72	24.3	413	22.8
	300～499床	8	4	114	40.5	324	40.4
	500床以上	13	2	144	57.2	743	49.5
	全体	38	1	144	38.9	1,480	39.3

1-225. 2019年4月～2020年3月の期間で貯血式自己血輸血の実績(実際に輸血されたもの)

貯血式自己血輸血の実績(単位)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 全血／単位	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	27	2	208	56.7	1,531	64.2
	300～499床	11	6	2,181	303.7	3,341	637.0
	500床以上	14	31	1,359	312.1	4,370	349.4
	全体	52	2	2,181	177.7	9,242	359.1
(2) MAP／単位	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	3	12	440	171.7	515	233.8
	全体	3	12	440	171.7	515	233.8
(3) FFP／単位	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	2	61	444	252.5	505	270.8
	全体	2	61	444	252.5	505	270.8
(4) フィブリン糊	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	2	12	426	219.0	438	292.7
	全体	2	12	426	219.0	438	292.7
(5) 血小板糊／単位	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	0	－	－	－	－	－
	全体	0	－	－	－	－	－

1-226. 2019年4月～2020年3月の期間で希釈式自己血を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.0%	0	0.0%	2	4.1%	2	4.1%	4	8.2%
2	使用していない	0	0.0%	26	53.1%	10	20.4%	9	18.4%	45	91.8%
	回答施設合計	0		26		12		11		49	

1-227. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した、希釈式自己血の使用総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 希釈式自己血(200mL)使用総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	2	3	5	4.0	8	1.4
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	2	3	5	4.0	8	1.4
(2) 希釈式自己血(400mL)使用総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	2	10	35	22.5	45	17.7
	500床以上	2	15	18	16.5	33	2.1
	全体	4	10	35	19.5	78	10.8

【特別集計:希釈式自己血の使用総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
希釈式自己血の使用総袋(本)数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	2	13	40	26.5	53	19.1
	500床以上	2	15	18	16.5	33	2.1
	全体	4	13	40	21.5	86	12.5
希釈式自己血の総単位数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	2	23	75	49.0	98	36.8
	500床以上	2	30	36	33.0	66	4.2
	全体	4	23	75	41.0	164	23.3

1-228. 2019年4月～2020年3月の期間で回収式自己血を使用しましたか

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい(濃縮・洗浄法)	0	0.0%	1	2.1%	4	8.5%	3	6.4%	8	17.0%
2	はい(濾過法)	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	2	4.3%	3	6.4%
3	いいえ	0	0.0%	25	53.2%	6	12.8%	5	10.6%	36	76.6%
	回答施設合計	0		26		11		10		47	

1-229. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した、回収式自己血の件数と使用総量を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 回収式自己血使用件数(件)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	28	28	28.0	28	—
	300～499床	4	9	204	66.5	266	92.4
	500床以上	2	144	301	222.5	445	111.0
	全体	7	9	301	105.6	739	113.6
(2) 回収式自己血使用総量(mL)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	4,958	4,958	4,958.0	4,958	—
	300～499床	3	5,428	225,450	80,099.7	240,299	125,892.9
	500床以上	1	124,791	124,791	124,791.0	124,791	—
	全体	5	4,958	225,450	74,009.6	370,048	98,939.6

1-230. 自己フィブリン糊を作製していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	自己クリオプレシピレート(用手法)を作製している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.1%	2	4.1%
2	自己フィブリン糊(調製装置法)を作製している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	1	2.0%
3	自己クリオプレシピレート(用手法)と自己フィブリン糊(調製装置法)の両方を作製している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	いいえ(将来作製予定)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	いいえ(今後も作製する予定はない)	0	0.0%	27	55.1%	10	20.4%	9	18.4%	46	93.9%
	回答施設合計	0		27		10		12		49	

1-231. 自己フィブリン糊を使用している診療科は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	脳神経外科・間脳下垂体外科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	心臓血管外科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	整形外科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	2	40.0%
4	産婦人科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%
5	呼吸器外科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	消化器外科・肝胆膵外科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7	歯科・口腔外科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	耳鼻咽喉科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%
9	皮膚科・形成外科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10	消化器内科	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%
	回答施設合計	0		0		0		5		5	

3-14) 血漿分画製剤の使用実績について

1-232. 2019年4月～2020年3月の期間で下記の該当する血漿分画製剤を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	3	1.7%	80	46.5%	13	7.6%	12	7.0%	108	62.8%
2	使用していない	30	17.4%	32	18.6%	1	0.6%	1	0.6%	64	37.2%
	回答施設合計	33		112		14		13		172	

3-15) アルブミン製剤の使用実績について

1-233. 2019年4月～2020年3月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%)を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	2	1.7%	76	66.1%	13	11.3%	14	12.2%	105	91.3%
2	使用していない	3	2.6%	6	5.2%	0	0.0%	1	0.9%	10	8.7%
	回答施設合計	5		82		13		15		115	

1-234. 2019年4月～2020年3月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%)の使用本数を、国産・輸入別、規格別に本数で記入してください。

等張アルブミン製剤5%(5.0g/100mL)使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産(採血国:日本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	15	15	15.0	15	—
	全体	1	15	15	15.0	15	—
輸入(採血国:海外、献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
輸入(採血国:海外、非献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
国産・輸入の詳細不明	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
合計(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	15	15	15.0	15	—
	全体	1	15	15	15.0	15	—

等張アルブミン製剤5%(12.5g/250 mL)使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産(採血国:日本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	11	4	315	64.9	714	91.1
	300~499床	6	54	887	379.0	2,274	296.9
	500床以上	5	390	3,518	2,129.2	10,646	1,418.5
	全体	22	4	3,518	619.7	13,634	1,062.3
輸入(採血国:海外、献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	5	1	480	104.8	524	209.8
	300~499床	3	42	1,945	998.3	2,995	951.5
	500床以上	6	40	1,060	552.7	3,316	442.0
	全体	14	1	1,945	488.2	6,835	588.6
輸入(採血国:海外、非献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	1	16	16	16.0	16	—
	300~499床	1	27	27	27.0	27	—
	500床以上	2	37	1,045	541.0	1,082	712.8
	全体	4	16	1,045	281.3	1,125	509.2
国産・輸入の詳細不明	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
合計(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	17	1	480	73.8	1,254	129.5
	300~499床	10	27	1,945	529.6	5,296	605.5
	500床以上	11	76	3,518	1,367.6	15,044	1,205.2
	全体	38	1	3,518	568.3	21,594	889.8

高張アルブミン製剤20%(4.0g/20 mL)使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産(採血国:日本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
輸入(採血国:海外、献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
輸入(採血国:海外、非献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
国産・輸入の詳細不明	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
合計(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

高張アルブミン製剤20%(10.0g/50 mL)使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産(採血国:日本)	0床	1	9	9	9.0	9	—
	1~299床	20	6	1,096	204.5	4,090	249.1
	300~499床	5	9	912	463.6	2,318	361.3
	500床以上	6	560	3,927	2,017.0	12,102	1,397.6
	全体	32	6	3,927	578.7	18,519	934.5
輸入(採血国:海外、献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
輸入(採血国:海外、非献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	1	389	389	389.0	389	—
	500床以上	1	1,903	1,903	1,903.0	1,903	—
	全体	2	389	1,903	1,146.0	2,292	1,070.6
国産・輸入の詳細不明	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
合計(本)	0床	1	9	9	9.0	9	—
	1~299床	20	6	1,096	204.5	4,090	249.1
	300~499床	6	9	912	451.2	2,707	324.6
	500床以上	7	560	3,927	2,000.7	14,005	1,276.5
	全体	34	6	3,927	612.1	20,811	934.6

高張アルブミン製剤25%(5.0g/20 mL)使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産(採血国:日本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	1	63	63	63.0	63	—
	300~499床	1	196	196	196.0	196	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	2	63	196	129.5	259	94.0
輸入(採血国:海外、献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
輸入(採血国:海外、非献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
国産・輸入の詳細不明	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
合計(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	1	63	63	63.0	63	—
	300~499床	1	196	196	196.0	196	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	2	63	196	129.5	259	94.0

高張アルブミン製剤25%(12.5g/50 mL)使用本数							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
国産(採血国:日本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	41	2	553	117.4	4,813	139.3
	300~499床	6	431	1,359	810.5	4,863	362.9
	500床以上	6	43	2,495	1,372.5	8,235	900.8
	全体	53	2	2,495	337.9	17,911	541.5
輸入(採血国:海外、献血)	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
輸入(採血国:海外、非献血)	0床	1	18	18	18.0	18	—
	1~299床	10	12	422	113.4	1,134	120.6
	300~499床	3	196	955	676.0	2,028	417.5
	500床以上	2	628	1,088	858.0	1,716	325.3
	全体	16	12	1,088	306.0	4,896	370.5
国産・輸入の詳細不明	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	1	77	77	77.0	77	—
	300~499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	77	77	77.0	77	—
合計(本)	0床	1	18	18	18.0	18	—
	1~299床	53	2	553	115.0	6,097	132.3
	300~499床	8	196	1,602	861.4	6,891	486.3
	500床以上	8	43	2,495	1,243.9	9,951	807.1
	全体	70	2	2,495	328.0	22,957	519.4

【特別集計:アルブミン製剤使用量(g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤(5%)	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	17	13	6,000	922.1	15,675	1,618.4
	300～499床	10	338	24,313	6,620.0	66,200	7,568.6
	500床以上	11	950	44,050	17,102.3	188,125	15,078.2
	全体	38	13	44,050	7,105.3	270,000	11,129.0
(2) 高張アルブミン製剤(20%)	0床	1	90	90	90.0	90	－
	1～299床	20	60	10,960	2,045.0	40,900	2,490.8
	300～499床	6	90	9,120	4,511.7	27,070	3,245.8
	500床以上	7	5,600	39,270	20,007.1	140,050	12,765.4
	全体	34	60	39,270	6,120.9	208,110	9,345.6
(3) 高張アルブミン製剤(25%)	0床	1	225	225	225.0	225	－
	1～299床	54	25	6,913	1,417.2	76,528	1,645.0
	300～499床	8	2,450	20,025	10,889.7	87,118	5,963.6
	500床以上	8	538	31,188	15,548.4	124,388	10,089.2
	全体	71	25	31,188	4,060.0	288,258	6,465.1
(4) アルブミン製剤	0床	2	90	225	157.5	315	95.5
	1～299床	75	25	14,898	1,774.7	133,103	2,348.5
	300～499床	12	2,788	36,250	15,032.3	180,388	9,928.3
	500床以上	14	5,600	77,670	32,325.9	452,563	22,960.1
	全体	103	25	77,670	7,440.5	766,368	14,079.9

【特別集計：一般病床数あたりのアルブミン製剤使用量(g)】

一般病床数あたりのアルブミン製剤使用量(g)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤(5%)	1～299床	17	0.1	150.0	12.4	210.1	35.7
	300～499床	10	0.9	77.9	18.1	180.7	23.1
	500床以上	11	1.5	62.9	23.1	254.2	18.1
	全体	38	0.1	150.0	17.0	645.0	28.1
(2) 高張アルブミン製剤(20%)	1～299床	20	0.7	52.5	17.6	352.7	15.9
	300～499床	6	0.2	27.1	13.0	78.2	10.0
	500床以上	7	11.1	76.0	31.4	219.6	23.1
	全体	71	0.1	150.0	19.7	650.4	17.5
(3) 高張アルブミン製剤(25%)	1～299床	54	0.9	138.3	21.3	1,150.3	30.9
	300～499床	8	6.2	61.6	29.9	239.0	16.9
	500床以上	8	0.7	33.8	22.5	179.6	11.7
	全体	141	0.1	150.0	22.4	1,568.9	28.0
(4) アルブミン製剤	1～299床	75	0.7	202.5	22.8	1,713.0	34.7
	300～499床	12	7.1	116.2	41.5	497.8	30.0
	500床以上	14	11.1	111.0	46.7	653.5	28.6
	全体	242	0.1	202.5	28.4	2,864.3	34.5

3-16) 加熱人血漿蛋白製剤の使用実績について

1-235. 2019年4月～2020年3月の期間で加熱人血漿蛋白(等張アルブミン製剤:4.4%)を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	1	0.9%	11	9.7%	2	1.8%	2	1.8%	16	14.2%
2	使用していない	4	3.5%	72	63.7%	11	9.7%	10	8.8%	97	85.8%
	回答施設合計	5		83		13		12		113	

1-236. 2019年4月～2020年3月の期間で加熱人血漿蛋白製剤(等張アルブミン製剤:4.4%)の使用本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤 4.4%(100mL) 使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	3	13	21	15.7	47	4.6
	300～499床	1	191	191	191.0	191	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	4	13	191	59.5	238	87.7
加熱人血漿蛋白製剤 4.4%(250mL) 使用本数	0床	1	773	773	773.0	773	—
	1～299床	8	1	265	66.8	534	92.3
	300～499床	2	142	574	358.0	716	305.5
	500床以上	2	230	271	250.5	501	29.0
	全体	13	1	773	194.2	2,524	237.8

【特別集計:加熱人血漿蛋白製剤使用量(g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤	0床	1	8,503	8,503	8,503.0	8,503	—
	1～299床	11	11	2,915	552.8	6,081	904.5
	300～499床	2	2,402	6,314	4,358.2	8,716	2,765.9
	500床以上	2	2,530	2,981	2,755.5	5,511	318.9
	全体	16	11	8,503	1,800.7	28,811	2,488.5

【特別集計:一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白製剤使用量(g)】

一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白製剤使用量(g) (計算式:加熱人血漿蛋白製剤使用量÷一般病床数)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤	1～299床	11	0.1	10.4	3.9	43.4	4.1
	300～499床	2	7.6	18.8	13.2	26.4	7.9
	500床以上	2	5.0	5.8	5.4	10.8	0.6
	全体	15	0.1	18.8	5.4	80.6	5.2

3-17) 免疫グロブリン製剤(静注)の使用実績について

1-237. 2019年4月～2020年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.0%	46	40.4%	12	10.5%	11	9.6%	69	60.5%
2	使用していない	6	5.3%	38	33.3%	0	0.0%	1	0.9%	45	39.5%
	回答施設合計	6		84		12		12		114	

1-238. 2019年4月～2020年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)の使用本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:静注5% (0.5g/10mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	3	12	199	115.7	347	95.1
	500床以上	2	52	107	79.5	159	38.9
	全体	5	12	199	101.2	506	72.8
(2) 免疫グロブリン製剤:静注5% (1.0g/20mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) 免疫グロブリン製剤:静注5% (2.5g/50mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	31	2	312	59.5	1,843	74.7
	300～499床	11	1	1,389	312.1	3,433	414.4
	500床以上	7	1	1,846	342.3	2,396	669.9
	全体	49	1	1,846	156.6	7,672	334.7
(4) 免疫グロブリン製剤:静注5% (5.0g/100mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	13	1	429	76.5	995	110.5
	300～499床	9	36	939	420.0	3,780	267.0
	500床以上	8	40	4,385	1,243.3	9,946	1,395.8
	全体	30	1	4,385	490.7	14,721	854.2
(5) 免疫グロブリン製剤:静注5% (10.0g/200mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

1-238. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(6) 免疫グロブリン製剤: 静注10% (0.5g/5mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	1	79	79	79.0	79	—
	500床以上	3	2	145	51.0	153	81.4
	全体	4	2	145	58.0	232	67.9
(7) 免疫グロブリン製剤: 静注10% 2.5g/25mL/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	1	4	4	4.0	4	—
	300~499床	2	24	162	93.0	186	97.6
	500床以上	3	35	116	86.0	258	44.4
	全体	6	4	162	74.7	448	62.5
(8) 免疫グロブリン製剤: 静注10% (5.0g/50mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	6	7	197	70.2	421	72.6
	300~499床	2	50	1,050	550.0	1,100	707.1
	500床以上	6	131	815	450.2	2,701	307.2
	全体	14	7	1,050	301.6	4,222	348.1
(9) 免疫グロブリン製剤: 静注10% (10.0g/100mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	1	141	141	141.0	141	—
	500床以上	3	36	802	317.0	951	421.8
	全体	4	36	802	273.0	1,092	355.4
(10) 免疫グロブリン製剤: 静注10% (20.0g/200mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	0	—	—	—	—	—
	300~499床	1	6	6	6.0	6	—
	500床以上	2	202	340	271.0	542	97.6
	全体	3	6	340	182.7	548	167.8

【特別集計: 免疫グロブリン製剤(静注)使用量(g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤	0床	0	—	—	—	—	—
	1~299床	45	10	3,130	259.9	11,698	482.7
	300~499床	12	563	8,093	2,932.5	35,191	2,557.9
	500床以上	10	215	32,499	9,037.6	90,376	9,296.6
	全体	67	10	32,499	2,048.7	137,264	4,770.3

【特別集計：一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤(静注)使用量(g)】

一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量(g) (計算式:免疫グロブリン製剤使用量÷一般病床数)							
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
免疫グロブリン製剤	1～299床	45	0.1	16.8	2.3	105.1	3.3
	300～499床	12	1.4	25.6	7.9	95.4	7.1
	500床以上	10	0.4	34.9	12.6	125.7	10.3
	全体	67	0.1	34.9	4.9	326.2	6.7

1-239. 2019年4月～2020年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)の投与患者数について

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
免疫グロブリン製剤(静注)の投与患者数	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	44	1	179	17.8	784	29.7
	300～499床	12	2	1,389	188.1	2,257	384.6
	500床以上	9	16	415	137.6	1,238	125.0
	全体	65	1	1,389	65.8	4,279	181.9

1-240. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(静注)の、診療科別に総本数と総グラム数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	6	58	32.0	64
		300～499床	4	10	56	24.3	97
		500床以上	4	1	174	63.3	253
		全体	10	1	174	41.4	414
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	30	290	160.0	320
		300～499床	4	38	140	76.9	308
		500床以上	4	5	870	335.0	1,340
		全体	10	5	870	196.8	1,968
(2) 消化器外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	13	3	118	30.5	397
		300～499床	6	3	93	41.7	250
		500床以上	7	6	101	51.4	360
		全体	26	3	118	38.7	1,007
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	13	15	525	133.7	1,738
		300～499床	6	8	4,575	871.3	5,228
		500床以上	7	30	490	202.2	1,416
		全体	26	8	4,575	322.3	8,381
(3) 脳神経外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	5	1	33	16.0	80
		300～499床	2	1	55	28.0	56
		500床以上	5	5	88	40.6	203
		全体	12	1	88	28.3	339
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	5	3	165	71.0	355
		300～499床	2	5	138	71.3	143
		500床以上	5	25	295	134.0	670
		全体	12	3	295	97.3	1,168

1-240. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	6	6	6.0	—
		300～499床	1	6	6	6.0	—
		500床以上	2	8	11	9.5	2.1
		全体	4	6	11	7.8	2.4
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	15	15	15.0	—
		300～499床	1	15	15	15.0	—
		500床以上	2	40	100	70.0	42.4
		全体	4	15	100	42.5	40.1
(5) 整形外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	6	3	52	16.3	98
		300～499床	1	9	9	9.0	—
		500床以上	3	3	6	4.0	1.7
		全体	10	3	52	11.9	14.7
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	6	15	148	55.0	330
		300～499床	1	45	45	45.0	—
		500床以上	3	15	30	20.0	60
		全体	10	15	148	43.5	435
(6) 産婦人科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	6	6	6.0	—
		500床以上	4	1	12	7.8	31
		全体	5	1	12	7.4	37
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	15	15	15.0	—
		500床以上	4	15	60	38.8	24.6
		全体	5	15	60	34.0	170

1-240. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	34	141	87.5	75.7
		300～499床	1	83	83	83.0	—
		500床以上	5	25	546	295.2	1,476
		全体	8	25	546	216.8	1,734
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	85	705	395.0	790
		300～499床	1	415	415	415.0	—
		500床以上	5	125	3,030	1,558.0	7,790
		全体	8	85	3,030	1,124.4	8,995
(8) 泌尿器科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	5	2	70	20.2	101
		300～499床	5	2	68	18.8	94
		500床以上	6	1	739	152.5	915
		全体	16	1	739	69.4	1,110
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	5	10	350	92.0	460
		300～499床	5	5	170	52.5	263
		500床以上	6	18	770	207.9	1,248
		全体	16	5	770	123.1	1,970
(9) その他の外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	5	3	58	17.0	85
		300～499床	5	7	59	28.0	140
		500床以上	4	3	38	16.3	65
		全体	14	3	59	20.7	290
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	5	8	290	76.5	383
		300～499床	5	35	190	93.5	468
		500床以上	4	15	188	87.5	350
		全体	14	8	290	85.7	1,200

1-240. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) 血液内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	78	78	78	—
		300～499床	4	9	639	741	304.0
		500床以上	6	36	454	1,062	148.0
		全体	11	9	639	1,881	199.1
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	780	780	780	—
		300～499床	4	45	2,524	710.4	2,841
		500床以上	6	168	2,555	896.3	5,378
		全体	11	45	2,555	818.1	8,999
(11) 循環器内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	8	2	60	22.3	178
		300～499床	6	1	88	24.0	144
		500床以上	4	2	75	25.5	102
		全体	18	1	88	23.6	424
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	8	15	300	98.8	791
		300～499床	6	3	440	118.0	708
		500床以上	4	10	370	114.4	458
		全体	18	3	440	108.7	1,956
(12) 消化器内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	4	10	52	21.8	87
		300～499床	7	6	51	20.4	143
		500床以上	6	8	156	54.2	325
		全体	17	6	156	32.6	555
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	4	30	130	68.8	275
		300～499床	7	15	630	150.7	1,055
		500床以上	6	20	780	284.7	1,708
		全体	17	15	780	178.7	3,038

1-240. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	132	132	132	—
		300～499床	3	3	147	187	75.3
		500床以上	3	3	39	50	19.5
		全体	7	3	147	369	61.3
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	660	660	660.0	—
		300～499床	3	15	458	194.2	232.9
		500床以上	3	15	375	143.3	201.0
		全体	7	15	660	238.9	1,673
(14) 腎臓内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	3	6	58	114	28.0
		300～499床	5	1	113	154	47.0
		500床以上	5	3	129	258	54.1
		全体	13	1	129	40.5	526
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	3	15	833	331.8	439.1
		300～499床	5	3	306	87.2	436
		500床以上	5	15	645	229.4	1,147
		全体	13	3	833	198.3	2,579
(15) 神経内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	6	5	938	410.0	2,460
		500床以上	7	61	3,432	999.9	6,999
		全体	13	5	3,432	727.6	9,459
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	6	25	3,555	1,642.1	9,853
		500床以上	7	303	19,721	5,603.3	39,223
		全体	13	25	19,721	3,775.0	49,076

1-240. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 膠原病リウマチ科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	3	197	728	406.7	282.6
		500床以上	4	3	321	172.0	688
		全体	7	3	728	272.6	1,908
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	3	968	3,266	1,902.8	5,708
		500床以上	4	15	2,373	969.6	3,879
		全体	7	15	3,266	1,369.5	9,587
(17) 内分泌代謝科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	15	15	15.0	15
		300～499床	2	2	22	12.0	24
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	3	2	22	13.0	39
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	38	38	37.5	38
		300～499床	2	10	11	10.5	21
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	3	10	38	19.5	59
(18) その他の内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	16	3	309	56.4	903
		300～499床	6	6	555	124.7	748
		500床以上	2	31	841	436.0	872
		全体	24	3	841	105.1	2,523
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	15	5	965	174.7	2,620
		300～499床	6	30	2,758	569.2	3,415
		500床以上	2	155	42,050	21,102.5	42,205
		全体	23	5	42,050	2,097.4	48,240

1-240. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(20) 小児科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	2	2	2	—
		300～499床	6	14	488	1,417	170.5
		500床以上	7	161	1,155	3,138	370.4
		全体	14	2	1,155	4,557	307.2
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	1	5	5	5	—
		300～499床	6	35	1,723	5,729	703.5
		500床以上	7	709	3,043	11,957	921.7
		全体	14	5	3,043	17,691	924.6
(21) 腫瘍治療科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—

1-240. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 救急科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	4	1	386	400	190.7
		500床以上	7	12	80	271	24.3
		全体	11	1	386	671	110.5
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	4	5	1,058	1,103	521.7
		500床以上	7	30	380	1,280	120.1
		全体	11	5	1,058	2,383	304.1
(23) 歯科・口腔外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	3	3	3	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	3	3	3	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	15	15	15	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	15	15	15	—
(24) その他の診療科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	12	27	39	10.6
		300～499床	2	1	117	118	82.0
		500床以上	4	1	35	63	14.4
		全体	8	1	117	220	38.0
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	2	30	68	98	26.5
		300～499床	2	3	293	295	205.1
		500床以上	4	3	250	388	107.5
		全体	8	3	293	780	111.6

1-241. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(静注)の使用場所別に総本数と総グラム数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	38	4	626	69.1	2,626
		300～499床	12	225	1,783	688.3	8,260
		500床以上	9	43	6,069	1,553.6	13,982
		全体	59	4	6,069	421.5	24,868
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	38	9	3,130	272.8	10,366
		300～499床	11	563	7,320	2,767.0	30,438
		500床以上	9	215	19,608	5,028.4	45,255
		全体	58	9	19,608	1,483.8	86,059
(2) 外来	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	4	3	44	19.5	78
		300～499床	3	2	181	74.7	224
		500床以上	7	12	1,814	502.6	3,518
		全体	14	2	1,814	272.9	3,820
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	4	8	110	53.1	213
		300～499床	3	1	905	370.3	1,111
		500床以上	7	60	11,150	3,026.4	21,185
		全体	14	1	11,150	1,607.8	22,509
(3) 救急外来	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	5	5	5.0	5
		500床以上	2	1	1	1.0	2
		全体	3	1	5	2.3	7
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	13	13	12.5	13
		500床以上	2	5	5	5.0	10
		全体	3	5	13	7.5	23

1-241. (続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 手術室	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	1	2	1.5	3	0.7
		500床以上	1	9	9	9.0	9	—
		全体	3	1	9	4.0	12	4.4
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	3	10	6.3	13	5.3
		500床以上	1	45	45	45.0	45	—
		全体	3	3	45	19.2	58	22.7
(5) 集中治療室	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	6	26	386	114.5	687	138.6
		500床以上	6	9	464	160.3	962	213.7
		全体	12	9	464	137.4	1,649	173.4
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	6	108	1,058	398.9	2,393	384.8
		500床以上	6	38	1,696	649.9	3,900	800.9
		全体	12	38	1,696	524.4	6,293	613.2
(6) 医療機関外	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-241. (続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) その他	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	15	15	15.0	15	—
		500床以上	1	8	8	8.0	8	—
		全体	2	8	15	11.5	23	4.9
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	38	38	37.5	38	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	38	38	37.5	38	—

1-242. 免疫グロブリン製剤(静注)について2019年4月～2020年3月の期間で使用した製剤の適応疾患の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 重症感染症	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	35	1	198	25.0	875	39.3
	300～499床	8	5	48	21.0	168	15.6
	500床以上	7	1	360	87.3	611	133.3
	全体	50	1	360	33.1	1,654	61.4
(2) 低・無ガンマグロブリン血症	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	3	1	16	6.0	18	8.7
	300～499床	6	1	730	123.0	738	297.4
	500床以上	6	1	389	76.2	457	153.7
	全体	15	1	730	80.9	1,213	205.0
(3) 川崎病	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1	1	1.0	1	—
	300～499床	5	16	407	123.2	616	160.1
	500床以上	4	44	82	55.3	221	18.0
	全体	10	1	407	83.8	838	116.2
(4) グラン・バレー症候群	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1	1	1.0	1	—
	300～499床	3	3	6	4.3	13	1.5
	500床以上	4	1	165	45.3	181	79.9
	全体	8	1	165	24.4	195	56.9
(5) 特発性血小板減少性紫斑病	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	5	1	5	2.2	11	1.8
	300～499床	3	1	75	25.7	77	42.7
	500床以上	4	1	136	39.3	157	64.6
	全体	12	1	136	20.4	245	42.0
(6) 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1	1	1.0	1	—
	300～499床	2	1	3	2.0	4	1.4
	500床以上	5	1	334	70.6	353	147.3
	全体	8	1	334	44.8	358	116.9
(7) 多発筋炎・皮膚筋炎	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1	1	1.0	1	—
	300～499床	3	1	90	31.0	93	51.1
	500床以上	2	1	124	62.5	125	87.0
	全体	6	1	124	36.5	219	55.7

1-242. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(8) 重症筋無力症	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	2	2	2.0	2	—
	300～499床	3	2	15	6.3	19	7.5
	500床以上	4	2	260	67.8	271	128.2
	全体	8	2	260	36.5	292	90.4
(9) 天疱瘡	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	3	3	3.0	3	—
	500床以上	3	1	140	52.7	158	76.1
	全体	4	1	140	40.3	161	66.9
(10) チャーグ・ストラウス症候群	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	30	30	30.0	30	—
	全体	1	30	30	30.0	30	—
(11) スティーブンス・ジョンソン症候群	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	4	4	4.0	4	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	4	4	4.0	4	—
(12) 血清IgG2値の低下を伴う急性中耳炎 および呼吸器感染症	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(13) 抗ドナー抗体陽性腎移植における術前脱感作	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(14) 視神経炎急性期	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

1-242. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(15) その他	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	4	1	58	16.3	65	27.9
	300～499床	4	1	6	3.3	13	2.2
	500床以上	5	2	10	6.2	31	3.2
	全体	13	1	58	8.4	109	15.2

3-18) 免疫グロブリン製剤(皮下注)の使用実績について

1-243. 2019年4月～2020年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)を使用しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.0%	1	0.9%	2	1.9%	3	2.8%	6	5.6%
2	使用していない	5	4.7%	78	72.9%	10	9.3%	8	7.5%	101	94.4%
	回答施設合計	5		79		12		11		107	

1-244. 2019年4月～2020年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)の使用本数を、規格別に記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:皮下注20% (1.0g/5mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	2	87	310	198.5	397	157.7
	500床以上	1	12	12	12.0	12	—
	全体	3	12	310	136.3	409	155.0
(2) 免疫グロブリン製剤:皮下注20% (2.0g/10mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	190	190	190.0	190	—
	500床以上	2	6	27	16.5	33	14.8
	全体	3	6	190	74.3	223	100.7
(3) 免疫グロブリン製剤:皮下注20% (4.0g/20mL)/本	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	6	6	6.0	6	—
	300～499床	2	56	302	179.0	358	173.9
	500床以上	3	12	32	19.3	58	11.0
	全体	6	6	302	70.3	422	114.9

【特別集計:免疫グロブリン製剤(皮下注)使用量(g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤(皮下注)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	24	24	24.0	24	—
	300～499床	2	534	1,675	1,104.5	2,209	806.8
	500床以上	3	68	140	103.3	310	36.0
	全体	6	24	1,675	423.8	2,543	640.0

【特別集計：一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤(皮下注)使用量(g)】

一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量(g) (計算式:免疫グロブリン製剤使用量÷一般病床数)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤(皮下注)	1～299床	1	0.1	0.1	0.1	0.1	－
	300～499床	2	1.6	5.3	3.4	6.9	2.6
	500床以上	3	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1
	全体	6	0.1	5.3	1.2	7.4	2.1

1-245. 2019年4月～2020年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)の投与患者数について

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤(皮下注)の投与患者数	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	1	1	1	1.0	1	－
	300～499床	2	1	18	9.5	19	12.0
	500床以上	3	1	6	3.3	10	2.5
	全体	6	1	18	5.0	30	6.7

1-246. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(皮下注)の、診療科別に総本数と総グラム数を記入してください。

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(2) 消化器外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(3) 脳神経外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	3	3	3.0	3	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	3	3	3.0	3	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	3	3	3.0	3	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	3	3	3.0	3	—

1-246. (続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(5) 整形外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	1	2	2	2.0	2	—
		全体	1	2	2	2.0	2	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	1	4	4	4.0	4	—
		全体	1	4	4	4.0	4	—
(6) 産婦人科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-246. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(8) 泌尿器科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(9) その他の外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	12	12	12.0	12
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	12	12	12.0	12
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	24	24	24.0	24
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	24	24	24.0	24

1-246. (続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) 血液内科	使用本数	0床	0	－	－	－	－	－
		1～299床	1	6	6	6.0	6	－
		300～499床	0	－	－	－	－	－
		500床以上	1	5	5	5.0	5	－
		全体	2	5	6	5.5	11	0.7
	使用グラム数	0床	0	－	－	－	－	－
		1～299床	1	24	24	24.0	24	－
		300～499床	0	－	－	－	－	－
		500床以上	1	14	14	14.0	14	－
		全体	2	14	24	19.0	38	7.1
(11) 循環器内科	使用本数	0床	0	－	－	－	－	－
		1～299床	0	－	－	－	－	－
		300～499床	0	－	－	－	－	－
		500床以上	0	－	－	－	－	－
		全体	0	－	－	－	－	－
	使用グラム数	0床	0	－	－	－	－	－
		1～299床	0	－	－	－	－	－
		300～499床	0	－	－	－	－	－
		500床以上	0	－	－	－	－	－
		全体	0	－	－	－	－	－
(12) 消化器内科	使用本数	0床	0	－	－	－	－	－
		1～299床	0	－	－	－	－	－
		300～499床	0	－	－	－	－	－
		500床以上	0	－	－	－	－	－
		全体	0	－	－	－	－	－
	使用グラム数	0床	0	－	－	－	－	－
		1～299床	0	－	－	－	－	－
		300～499床	0	－	－	－	－	－
		500床以上	0	－	－	－	－	－
		全体	0	－	－	－	－	－

1-246. (続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 呼吸器内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(14) 腎臓内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	6	6	6.0	6	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	6	6	6.0	6	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	12	12	12.0	12	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	12	12	12.0	12	—
(15) 神経内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	3	12	44	22.7	68	18.5
		全体	3	12	44	22.7	68	18.5
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	3	48	140	78.7	236	53.1
		全体	3	48	140	78.7	236	53.1

1-246. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 膠原病リウマチ科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	495	495	495.0	495
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	495	495	495.0	495
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	1,403	1,403	1,403.0	1,403
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	1	1,403	1,403	1,403.0	1,403
(17) 内分泌代謝科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(18) その他の内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	53	366	209.5	419
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	2	53	366	209.5	419
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	212	534	373.0	746
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	2	212	534	373.0	746

1-246. (続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 精神科・心療内科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(20) 小児科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	1	27	27	27.0	27	—
		全体	1	27	27	27.0	27	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	1	54	54	54.0	54	—
		全体	1	54	54	54.0	54	—
(21) 腫瘍治療科	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-246. (続き)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 救急科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(23) 歯科・口腔外科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—
(24) その他の診療科	使用本数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	16	16	16.0	16
		500床以上	1	1	1	1.0	1
		全体	2	1	16	8.5	17
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	1	32	32	32.0	32
		500床以上	1	2	2	2.0	2
		全体	2	2	32	17.0	34

1-247. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(皮下注)の使用場所別に総本数と総グラム数を記入してください。

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	41	41	41.0	41	—
		500床以上	1	6	6	6.0	6	—
		全体	2	6	41	23.5	47	24.7
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	123	123	123.0	123	—
		500床以上	1	15	15	15.0	15	—
		全体	2	15	123	69.0	138	76.4
(2) 外来	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	6	6	6.0	6	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	2	38	39	38.5	77	0.7
		全体	3	6	39	27.7	83	18.8
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	1	24	24	24.0	24	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	2	102	125	113.5	227	16.3
		全体	3	24	125	83.7	251	52.9
(3) 救急外来	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-247. (続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 手術室	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
(5) 集中治療室	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	16	16	16.0	16	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	16	16	16.0	16	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	1	32	32	32.0	32	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	1	32	32	32.0	32	—
(6) 医療機関外	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	366	528	447.0	894	114.6
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	2	366	528	447.0	894	114.6
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	2	534	1,531	1,032.5	2,065	705.0
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	2	534	1,531	1,032.5	2,065	705.0

1-247. (続き)

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) その他	使用本数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—
	使用グラム数	0床	0	—	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—	—
		300～499床	0	—	—	—	—	—
		500床以上	0	—	—	—	—	—
		全体	0	—	—	—	—	—

1-248. 免疫グロブリン製剤(皮下注)について2019年4月～2020年3月の期間で使用した製剤の適応疾患の件数は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 低・無ガンマグロブリン血症	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1	1	1.0	1	—
	300～499床	2	1	16	8.5	17	10.6
	500床以上	1	29	29	29.0	29	—
	全体	4	1	29	11.8	47	13.5
(2) 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	2	1	4	2.5	5	2.1
	全体	2	1	4	2.5	5	2.1
(3) その他	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	1	2	2	2.0	2	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	1	2	2	2.0	2	—

1-249. 在宅使用における皮下注用免疫グロブリン製剤を供給していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	供給している	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	16.7%	3	50.0%
2	供給していない	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	2	33.3%	3	50.0%
	回答施設合計	0		1		2		3		6	

1-250. 在宅使用における皮下注用免疫グロブリン製剤の供給は

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	薬剤部から供給している	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
2	輸血部門から供給している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	院外処方箋を渡している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	診療科にストックされた製剤を診療科医師が渡している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		0		2		1		3	

1-251. 2019年4月～2020年3月の期間で在宅使用における皮下注用免疫グロブリン製剤の使用実患者数と使用量について

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
在宅使用の免疫グロブリン製剤(皮下注)	使用実患者数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	1	16	8.5	10.6
		500床以上	1	3	3	3.0	—
		全体	3	1	16	6.7	20
	使用総グラム数	0床	0	—	—	—	—
		1～299床	0	—	—	—	—
		300～499床	2	534	1,531	1,032.5	2,065
		500床以上	1	736	736	736.0	—
		全体	3	534	1,531	933.7	2,801

1-252. 在宅使用における皮下注用免疫グロブリン製剤の使用記録について

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	薬剤部門が把握している	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
2	輸血部門が把握している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	診療科医師が把握している	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	把握していない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		0		2		1		3	

1-253. 在宅使用における皮下注用免疫グロブリン製剤の使用記録の内容について

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用日時	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	ロット番号	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
3	副作用の有無	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4	使用記録は返却されていない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		0		2		1		3	

【4】 その他

1-254. 回答内容を確認するため事務局からの問い合わせに対応いただけますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	9	6.4%	29	20.6%	8	5.7%	8	5.7%	54	38.3%
2	いいえ	22	15.6%	62	44.0%	3	2.1%	0	0.0%	87	61.7%
	回答施設合計	31		91		11		8		141	

【5】 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会 詳細調査

5-1) 異型適合血および輸血副作用の実態について

2-1. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血過誤によるABO型異型輸血、間違った同型輸血が発生しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	ない	33	19.0%	112	64.4%	14	8.0%	14	8.0%	173	99.4%
3	不明	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	回答施設合計	33		113		14		14		174	

「(1)ある」場合、症例数を整数で記入して下さい

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
「(1)ある」場合、症例数/(件)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—

2-2. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血用血液製剤(赤血球製剤、血小板製剤、血漿製剤)のABO異型適合血輸血を実施した事例はありましたか。

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	3	1.8%	7	4.1%	12	7.1%	22	12.9%
2	ない	32	18.8%	107	62.9%	6	3.5%	2	1.2%	147	86.5%
3	不明	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	回答施設合計	32		111		13		14		170	

2-3. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血用血液製剤のABO異型適合血輸血を実施した事例数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 同型血入手不能時のO型赤血球製剤の輸血事例数／件	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	1	4	4	4.0	4	－
	300～499床	1	4	4	4.0	4	－
	500床以上	4	1	3	1.8	7	1.0
	全体	6	1	4	2.5	15	1.4
(2) 同型血入手不能時のO型以外の赤血球製剤輸血事例数／件	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	0	－	－	－	－	－
	全体	0	－	－	－	－	－
(3) 血液型未確定時のO型赤血球製剤輸血事例数／件	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	5	1	10	3.8	19	3.6
	500床以上	4	14	65	42.0	168	23.4
	全体	9	1	65	20.8	187	24.8
(4) 血液型未確定時のO型以外の赤血球製剤輸血事例数／件	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	0	－	－	－	－	－
	全体	0	－	－	－	－	－
(5) 造血幹細胞移植による異型輸血事例数	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	1	116	116	116.0	116	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	3	8	40	20.3	61	17.2
	全体	4	8	116	44.3	177	49.9
(6) 造血幹細胞移植以外の移植による異型輸血事例数／件	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	0	－	－	－	－	－
	300～499床	0	－	－	－	－	－
	500床以上	1	12	12	12.0	12	－
	全体	1	12	12	12.0	12	－
(7) その他(理由を下の枠内に記入してください)事例数／件	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	1	1	1	1.0	1	－
	300～499床	1	7	7	7.0	7	－
	500床以上	2	3	16	9.5	19	9.2
	全体	4	1	16	6.8	27	6.7
(8) 合計事例数／件	0床	0	－	－	－	－	－
	1～299床	3	1	116	40.3	121	65.5
	300～499床	6	1	10	5.0	30	4.0
	500床以上	7	1	89	38.1	267	30.2
	全体	16	1	116	26.1	418	35.1

2-4. ABO異型輸血、間違った同型輸血以外の重篤な溶血性副作用(輸血過誤以外)が、2019年4月～2020年3月の期間で発生しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	発生していない	32	19.2%	110	65.9%	12	7.2%	13	7.8%	167	100.0%
3	不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	32		110		12		13		167	

2-5. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血関連急性肺障害 (TRALI)を経験されましたか(疑い例も含む)

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	経験した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	経験無い	32	19.3%	107	64.5%	12	7.2%	13	7.8%	164	98.8%
3	不明	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%
	回答施設合計	32		109		12		13		166	

2-6. 2019年4月～2020年3月の期間で重症アレルギー反応が、発生しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.6%
2	発生していない	32	19.6%	104	63.8%	11	6.7%	12	7.4%	159	97.5%
3	不明	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%
	回答施設合計	32		107		11		13		163	

「(1) 発生した」場合、症例数(件)	0床		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0床		0	—	—	—	—	—
	1～299床		0	—	—	—	—	—
	300～499床		0	—	—	—	—	—
	500床以上		1	10	10	10.0	10	—
	全体		1	10	10	10.0	10	—

2-7. 2019年4月～2020年3月の期間で移植片対宿主病(GVHD)が発生しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	発生していない	31	18.8%	108	65.5%	12	7.3%	13	7.9%	164	99.4%
3	不明	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	回答施設合計	31		109		12		13		165	

2-8. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血による重篤な細菌感染症を経験されましたか(疑い例も含む)

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	発生していない	32	19.4%	108	65.5%	11	6.7%	13	7.9%	164	99.4%
3	不明	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	回答施設合計	32		109		11		13		165	

2-9. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血関連循環過負荷(TACO)が発生しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	発生していない	32	19.3%	107	64.5%	12	7.2%	13	7.8%	164	98.8%
3	不明	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%
	回答施設合計	32		109		12		13		166	

2-10. 2019年4月～2020年3月の期間で上記(問2-4～問2-9)以外の重篤な副作用が発生しましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	発生していない	32	19.4%	105	63.6%	12	7.3%	13	7.9%	162	98.2%
3	不明	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%
	回答施設合計	32		108		12		13		165	

5-2) 輸血管理料について

2-11. 輸血管理料および加算の取得の有無について

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血管理料Ⅰと輸血適正使用加算を取得している	0	0.0%	4	2.4%	4	2.4%	7	4.2%	15	9.1%
2	輸血管理料Ⅰのみ取得している	0	0.0%	1	0.6%	2	1.2%	3	1.8%	6	3.6%
3	輸血管理料Ⅱと輸血適正使用加算を取得している	0	0.0%	21	12.7%	4	2.4%	2	1.2%	27	16.4%
4	輸血管理料Ⅱのみ取得している	0	0.0%	11	6.7%	3	1.8%	1	0.6%	15	9.1%
5	取得していない	32	19.4%	69	41.8%	0	0.0%	1	0.6%	102	61.8%
	回答施設合計	32		106		13		14		165	

2-12. 貯血式自己血輸血管理体制加算の取得の有無について

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	取得している	0	0.0%	3	1.9%	2	1.3%	9	5.8%	14	9.0%
2	取得する予定	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.6%
3	取得する予定なし	30	19.4%	98	63.2%	9	5.8%	3	1.9%	140	90.3%
	回答施設合計	30		101		12		12		155	

5-3) 大量出血時の輸血について

2-13. 2019年4月～2020年3月の期間で大量出血のため1日につき赤血球液10単位以上輸血した症例はありますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	0	0.0%	13	7.4%	12	6.8%	13	7.4%	38	21.6%
2	ない	33	18.8%	102	58.0%	2	1.1%	1	0.6%	138	78.4%
	回答施設合計	33		115		14		14		176	

2-14. 貴施設では大量出血・大量輸血時の凝固障害に対して何を用いて対応していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	新鮮凍結血漿のみ	0	0.0%	7	19.4%	11	30.6%	6	16.7%	24	66.7%
2	新鮮凍結血漿＋クリオプレシビート	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	1	2.8%
3	新鮮凍結血漿＋フィブリノゲン濃縮製剤	0	0.0%	4	11.1%	1	2.8%	6	16.7%	11	30.6%
4	新鮮凍結血漿＋クリオプレシビート、 または 新鮮凍結血漿＋フィブリノゲン濃縮製剤	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		11		12		13		36	

2-15. 問2-14で「(2)～(4)」と答えた施設では、クリオプレシビートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の投与基準を決めていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	決めている	0	0.0%	1	9.1%	1	9.1%	3	27.3%	5	45.5%
2	決めてない	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	3	27.3%	6	54.5%
	回答施設合計	0		4		1		6		11	

2-16. 問2-15で「(1) 決めている」と答えた施設では何を投与基準としていますか

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 出血量(mL)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	1,500	1,500	1,500.0	1,500	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	1,000	1,000	1,000.0	1,000	—
	全体	2	1,000	1,500	1,250.0	2,500	353.6
(2) PT値(%)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	10	10	10.0	10	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	30	30	30.0	30	—
	全体	2	10	30	20.0	40	14.1
(3)フィブリノゲン値	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	150	150	150.0	150	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	3	150	150	150.0	450	0.0
	全体	4	150	150	150.0	600	0.0

2-17. 問2-14で「(2)および(4)」と答えた施設で、2019年4月～2020年3月の期間で作成し使用した、クリオプレシピートの調製用製剤となった血漿製剤の使用総袋(本)数を記入してください。

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	106	106	106.0	106	—
	全体	1	106	106	106.0	106	—
(4) 合計／袋(本)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	106	106	106.0	106	—
	全体	1	106	106	106.0	106	—

2-18. 問2-14で「(2)～(4)」と答えた施設でクリオプレシピートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の1回の投与量は

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) クリオプレシピート／バック	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	3	3	3.0	3	—
	全体	1	3	3	3.0	3	—
フィブリノゲン濃縮製剤／g	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	2	3	13	8.0	16	7.1
	300～499床	1	3	3	3.0	3	—
	500床以上	3	1	3	2.3	7	1.2
	全体	6	1	13	4.3	26	4.3

2-19. 問2-14で「(2)～(4)」と答えた施設でクリオプレシピレートおよびフィブリノゲン濃縮製剤を使用する診療科と2019年4月～2020年3月の期間での件数は

クリオプレシピレート使用件数(件)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科(小児を含む)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	25	25	25.0	25	—
	全体	1	25	25	25.0	25	—
(2) 産科	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	1	1	1.0	1	—
	全体	1	1	1	1.0	1	—
(3) 救命救急	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	4	4	4.0	4	—
	全体	1	4	4	4.0	4	—
(4) 肝胆膵外科	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(5) 血液内科	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(6) その他	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	3	3	3.0	3	—
	全体	1	3	3	3.0	3	—

フィブリノゲン濃縮製剤使用件数(件)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科(小児を含む)	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	95	95	95.0	95	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	3	3	3.0	3	—
	全体	2	3	95	49.0	98	65.1
(2) 産科	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	1	3	3	3.0	3	—
	300～499床	1	6	6	6.0	6	—
	500床以上	1	29	29	29.0	29	—
	全体	3	3	29	12.7	38	14.2
(3) 救命救急	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	91	91	91.0	91	—
	全体	1	91	91	91.0	91	—
(4) 肝胆膵外科	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	3	3	3.0	3	—
	全体	1	3	3	3.0	3	—
(5) 血液内科	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	0	—	—	—	—	—
	全体	0	—	—	—	—	—
(6) その他	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	1	13	13	13.0	13	—
	全体	1	13	13	13.0	13	—

5-4) 院内成分採血細胞処理・凍結保存・保管に関する実施状況調査

2-20. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血部または関連する部門で下記の採血、細胞処理、凍結、保存を行っていますか

- (1) 血縁および非血縁末梢血幹細胞 (2) 自家末梢血幹細胞
(3) ドナーリンパ球(アフエーシス法) (4) 顆粒球採取(アフエーシス法)
(5) 自己リンパ球(アフエーシス法)

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	4	2.3%	5	2.9%
2	いいえ	33	18.9%	115	65.7%	12	6.9%	10	5.7%	170	97.1%
	回答施設合計	33		115		13		14		175	

2-21. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血部または関連する部門で、血縁および非血縁末梢血幹細胞採取を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	3	1.7%	4	2.3%
2	採取していない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.6%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

「(1) 採取した」場合、症例数を整数で記入して下さい

採取した症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	3	4	51	20.0	60	26.9
	全体	3	4	51	20.0	60	26.9

2-22. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血部または関連する部門で、自家末梢血幹細胞採取を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
2	採取していない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

「(1) 採取した」場合、症例数を整数で記入して下さい

採取した症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	4	5	41	16.8	67	16.6
	全体	4	5	41	16.8	67	16.6

2-23. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血部または関連する部門で、ドナーリンパ球採取(アフエーシス法)を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	採取していない	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

2-24. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血部または関連する部門で、顆粒球採取(アフエーシス法)を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	採取していない	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

2-25. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血部または関連する部門で、自己リンパ球(アフエーシス法)を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	採取していない	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

2-26. 2019年4月～2020年3月の期間で輸血部または関連する部門で細胞の凍結処理・保管管理を行いましたか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	採取した	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
2	採取していない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

「(1) 採取した」場合、症例数を整数で記入して下さい

採取した症例数(件)		施設数	最小値	最大値	平均値	合計値	標準偏差
	0床	0	—	—	—	—	—
	1～299床	0	—	—	—	—	—
	300～499床	0	—	—	—	—	—
	500床以上	4	5	41	19.0	76	15.4
	全体	4	5	41	19.0	76	15.4

2-27. 標準作業手順書(SOP)を作成・使用していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
2	いいえ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

2-28. 作業工程の記録をしていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	3	60.0%	4	80.0%
2	いいえ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%
	回答施設合計	0		0		1		4		5	

5-5) 細胞治療(再生医療等製品)に関する実施状況調査

2-29. 2019年4月～2020年3月の期間で下記の細胞治療(再生医療等製品)を使用しましたか

- (1) ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞 『テムセルHS注』
- (2) ヒト(自己)骨格筋由来細胞シート 『ハートシート』
- (3) ヒト(自己)表皮由来細胞シート 『ジェイス』
- (4) ヒト(自己)軟骨由来組織 『ジャック』
- (5) ヒト(自己)骨髄由来 間葉系幹細胞 『ステミラック注』
- (6) チサゲンレクルユーセル 『キムリア点滴静注』

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.6%	2	1.1%
2	いいえ	33	19.0%	115	66.1%	12	6.9%	12	6.9%	172	98.9%
	回答施設合計	33		115		13		13		174	

2-30. 2019年4月～2020年3月の期間で使用した細胞治療(再生医療等製品)は

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞 『テムセルHS注』	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	16.7%	2	33.3%
2	ヒト(自己)骨格筋由来細胞シート 『ハートシート』	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	2	33.3%
3	ヒト(自己)表皮由来細胞シート『ジェイス』	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	16.7%
4	ヒト(自己)軟骨由来組織『ジャック』	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	16.7%
5	ヒト(自己)骨髄由来 間葉系幹細胞 『ステミラック注』	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6	チサゲンレクルユーセル 『キムリア点滴静注』	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		0		1		5		6	

2-31. 投与記録の管理をしていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
2	いいえ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		0		1		1		2	

2-32. 投与記録の管理は院内のどの部署が担当していますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%
2	事務部門	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3	薬剤部	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	25.0%	2	50.0%
4	その他の部門	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	回答施設合計	0		0		1		3		4	

2-33. 再生医療等製品は誰が調製していますか

複数回答

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部医師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	9.1%
2	診療科医師	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	3	27.3%	4	36.4%
3	検査技師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	2	18.2%
4	薬剤師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	2	18.2%
5	その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	2	18.2%
	回答施設合計	0		0		1		10		11	

2-34. 調製している担当者は、認定細胞治療管理師の資格を持っていますか

番号	項目	0床		1～299床		300～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	3	75.0%
2	いいえ	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
	回答施設合計	0		0		1		3		4	